

des abeilles des colonies malades puissent se mêler avec celles des colonies saines et entrer dans leurs ruches.

En faisant tout l'ouvrage le soir, les abeilles ont le temps de se calmer avant le matin, et alors il n'y a ni confusion, ni trouble.

Lorsque les abeilles ne récoltent pas de miel, un rucher peut être guéri de la Loque, en enlevant les gâteaux malades le soir, et en donnant aux abeilles des cadres garnis de lisières de fondation. Alors le soir également, nourrissez abondamment les abeilles avec du sirop de sucre, et elles travailleront la fondation et y emmagasineront le miel contaminé, qu'elles ont emporté avec elles, des vieux gâteaux.

Le soir du quatrième jour, enlevez ces nouveaux gâteaux; remplacez-les par des cadres garnis de feuilles entières de fondation, nourrissez-les abondamment chaque soir, jusqu'à ce que la colonie soit en bon état, sous tous les rapports.

Faites le sirop avec du sucre granulé; mettez une livre d'eau pour deux livres de sucre et faites bouillir.

Lorsque vous trouvez la maladie dans quelques colonies seulement, et que le temps de la miellée est passé, ne vous troublez pas à ce propos, et laissez-les soigneusement tranquilles jusqu'en octobre; alors, le soir allez à ces colonies malades, enlevez-leur tous leurs gâteaux, et remplacez-les par six gâteaux pleins de miel et dont les cellules soient toutes operculées, pris dans les colonies saines, et de chaque côté de ces gâteaux, placez une planche de partition. Cela fera des colonies de première classe pour hiverner, et enrayera en même temps la maladie. Quelqu'un dira peut-être que la maladie ne peut être guérie aussi facilement, dans l'automne, par ce procédé. Cela se peut, cependant, et arrivera chaque fois, si la chose est faite convenablement; et si vous y réfléchissez un instant, vous comprendrez facilement que les abeilles doivent consommer le miel contaminé, qu'elles ont emporté des vieux gâteaux, car elles ne trouveront pas