

Sans perdre un instant j'ordonnais à ma malade de continuer le salicylate et je pratiquais une injection sous-conjonctivale de sublimé au millième.

Je vais me permettre ici, de donner un petit mot d'historique sur les injections sous-conjonctivales et sur leur manuel opératoire.

C'est à Secondi de Turin, que nous devons la découverte de ce précieux procédé thérapeutique. Il fut étudié successivement par Rothmund et de Wecker. Mais les premiers qui l'introduisirent en France furent les Drs Abadie et Darier. De très importants travaux ont été faits sur cette question par MM. les Drs De Wecker, Abadie, Darier, De Speville et Meyer, de Paris ; Lindsay, Johnson, de Londres et Grossmann de Berlin. Nous citerons aussi l'excellente thèse de notre ami le Dr Moissonnier de Paris.

Le manuel opératoire en est très simple.

Après avoir soigneusement désinfecté l'œil malade avec du sublimé (*Sol. au 2000ième*) on instille quelques gouttes de cocaïne pour produire l'anesthésie locale.

Pour l'injection on se sert d'une seringue de Pravaz munie d'une aiguille en platine iridié, on fait flamber cette aiguille à la flamme d'une lampe à alcool et lorsque l'on est bien certain qu'elle est parfaitement stérilisée, on puise dans un flacon bien bouché à l'éméri, la solution de sublimé.

Bichlorure d'Hydrargyre - - - - - 0.25 centigrammes.

Eau distillée et filtrée - - - - - 250 grammes.

Se mettant dans un bon éclairage, on dit au malade d'ouvrir fortement l'œil et on le fait regarder en haut ou en bas suivant l'endroit où l'on veut pratiquer l'injection.

L'injection se fait dans la conjonctive bulbaire aussi loin de la cornée que possible. Il est inutile d'injecter plus de cinq à six gouttes. D'avantage ne sert absolument à rien et fait souffrir le malade. Ces injections doivent se renouveler tous les deux jours jusqu'à guérison à peu près complète.

Je pratiquai donc à ma malade, une première injection sous-conjonctivale (3 Mars) ; je fis un pansement iodoformé (1 p. 10).

Le lendemain je retournai voir la malade. Elle n'a pas eu de délire la nuit précédente, elle a pu reposer une heure et demie, température 37.0. Beaucoup moins de douleurs, Localement pas de