

climats où l'individu se forme tard, que dans ceux où la formation est plus rapide, chez les enfants issus de parents faibles que chez ceux qui proviennent d'une race énergique et bien constituée, mais toujours la cause première se trouvera dans l'alimentation prématurée.

Laprairie, 7 Novembre 1872.

DR. S. A. LONGTIN.

THERAPEUTIQUE CHIRURGICALE.

NOUVEAU PROCÉDÉ DE DILATATION DU RÉTRÉCISSEMENT DE L'URÈTHRE, par M. Coze, ancien professeur à la faculté de médecine de Strasbourg, médecin principal de deuxième classe auxiliaire à l'hôpital militaire de Perpignan.

Les rétrécissements organiques du canal de l'urèthre peuvent être traités par trois moyens chirurgicaux : 1o. la dilatation ; 2o. la cautérisation ; 3o. l'uréthrotomie.

Incontestablement, lorsque le rétrécissement est très-difficile à franchir, le chirurgien commence par essayer la dilatation du canal, qui, dans bien des cas, sera l'unique traitement et, dans des circonstances différentes, permettra de mettre en usage les autres procédés curatifs.

Les moyens de dilatation actuellement consacrés par la pratique sont les bougies, les sondes et quelques instruments spéciaux.

Les Chirurgiens savent combien grandes sont les peines que leur donnent les rétrécissements très-étroits lorsqu'il s'agit de les franchir avec des bougies filiformes.

Le procédé de thérapeutique chirurgicale que je vais faire connaître pourra rendre service même aux spécialistes dont l'habileté reconnue a été plus d'une fois mise en défaut.

Il m'a été démontré dans plusieurs circonstances que l'emploi d'une pression liquide suffisante favorise d'une manière remarquable l'introduction de bougies que quelques instants auparavant on n'avait pu faire pénétrer, et que l'on peut arriver ainsi à une dilatation relativement très-grande sans dé-