Gen. Pimélode. Pimelodus, Cuv.

Queue arrondie ou à peine échancrée;

Dorsale à 7 rayons en tout;

Corps gros, ventre jaune, A. 21-23.... 1. catus.

Corps plus grêle, moins jaune, A. 29..... 2. atrarius.

Dorsale à 6 rayons en tout 3. pullus.

Queue, distinctement fourchie;

1. Le Pimélode chat. Pemelodus catus, Dekay. — Vulg. Burbotte; Angl. Common Horn-Pout; Catfish. — Longueur de 6 à 10 pouces. D'un brun olive, plus foncé sur le dos et la tête. Côtés de la tête cuivrés. Ventre d'un gris perlé.

Le plus commun de tous nos Pimélodes, qu'on rencontre partout depuis le Canada jusqu'à la Floride dans les rivières et les étangs à fond vaseux, et qui partout est désigné par le nom de barbotte. Au printemps, sa chair est d'un goût assez agréable, même fort estimée par plusieurs. La barbotte se construit en mai nne espèce de nid où elle dépose ses œufs. Elle creuse d'ordinaire en dessous des berges des rivières et construit une dame semi-circulaire en avant de son trou, laissant un espace pour entrer et un autre pour sortir. On la voit souvent cachée dans sa retraite ne laissant paraître au dehors que les barbillons qui ornent sa bouche.

Une singulière particularité de cette espèce c'est qu'on la rencontre souvent sans nageoire anale.

2. Pimélode noir. Pimelodus atrarius, Dekay; P. nebulosus, Storr.—Vulg. Barbotte noire; Angl. Horned Pout. — Longueur 7 à 9 pouces. D'un brun olive, presque noir sur le dos, côtés avec teinte cuivrée; dessous blanc-jaunâtre. Iris argentés; pupilles bleues Toutes les nageoires, brun foncé. Tête aplatie en dessus; corps assez allongé, comprimé postérieurement. Mâchoires armées de dents fines nombreuses. Bouche entourée de huit barbillons. Le premier rayon de la 1re dorsale est épineux, de même que celui des pectorales, ces épines sont plus courtes que les rayons qui suivent et dentelées sur leurs côtés.

Particulièrement commun dans le lac Ontario et les autres lacs de la province de Québec.