

*Natica clausa (affinis).*

*Buccinum undatum.*

*Balanus crenatus.*

*B. Hameri.*

*Mytilus edulis.*

Dans la couche No. 9 on a trouvé les fossiles suivants:—

*Mya arenaria.*

*M. truncata.*

*Nucula tenuis.*

*Balanus crenatus.*

*B. Hameri.*

*Mya (Young).*

On ne peut dire exactement d'où viennent les fossiles de la liste suivante mais il est probable qu'elles viennent aussi de la couche No. 9.

*Euryschisma Drobachiensis.*

*Nucula expansa.*

*Leda minuta.*

*L. limatula.*

*Bela turricula.*

*Trophon scalariforme.*

*Buccinum cyaneum.*

*B. Greenlandicum.*

*B. tenue.*

*Fusus tornatus.*

Deux espèces de *Spirorbis*.

Plante:—

*Zostera marina.*

*Rhizomata d'Equisetum* et fragments d'herbe.

On voit des couches semblables à celles décrites par Paisley le long de la côte et parfois à l'intérieur. Leur épaisseur maximum doit être considérable, car on en a constaté les parties incomplètement exposées présentant des épaisseurs d'au moins 100 pieds. Dans une localité en dehors du district dans la vallée du Nipisiguit et à environ 17 milles de son embouchure, on a observé une épaisseur de 25 pieds de sable en lits entre deux couches d'argile à blocs.

*Matériaux de moraines.* — Les sables et argiles stratifiés, les argiles à blocs, etc., ne se rencontrent pas sur la plus grande partie de ce district et en général, le terrain est couvert de cailloux qui, en