

Au seizième siècle, l'Amérique était habitée de l'Océan Arctique au cap Horn, des rivages de l'Atlantique à ceux du Pacifique, par des millions d'hommes offrant des types analogues, des caractères semblables à ceux des hommes de l'ancien continent. Toutes les nuances de la coloration se retrouvaient parmi eux, depuis le blanc rosé des habitants des Cordillères des Andes, des vallées formées par l'Amazoné ou de l'île Sainte-Catherine, jusqu'au noir de suie de quelques tribus de la Californie ou de la Floride, des indigènes de l'île de Saint-Vincent, ou bien des Charruas qui habitaient les rives sud du Rio de la Plata (1). Au Nord les Esquimaux étaient petits; au Sud les Patagons étaient remarquables par leur haute stature (2). Certaines tribus Indiennes se composaient d'individus aux membres grêles, aux extrémités fines; d'autres étaient robustes, fortement constitués. Chez les uns la tête était ronde; chez d'autres, au contraire, la dolichocéphalie était prononcée. Les uns avaient le système pileux très développé; chez les autres il l'était fort peu. Les uns rasaient leur tête, les autres laissaient pousser toute leur chevelure. Il serait long d'énumérer les différences de types et de races que devaient rencontrer les Européens, en pénétrant pour la première fois sur le continent Américain.

Ces hommes vivaient au milieu de mammifères, d'oiseaux, de poissons, de reptiles inconnus dans nos climats. Le lama (3) était leur seul animal domestique; ils l'utilisaient comme bête de somme; ils se nourrissaient de sa chair; ils se vêtaient

seur de Bourbonnais, *Histoire des nations civilisées du Mexique et de l'Amérique centrale*, 4 vol. — Southall, *Recent Origin of Man*. — Short, *The North Americans of Antiquity*. — Tylor, *Researches on the Primitive History of Man*. — Squier, *Peru, Incidents of Travel and Exploration in the Land of the Incas*. Avant tout, il faut mentionner l'important ouvrage de H. Bancroft, *The Native Races of the Pacific States of North America*, 5 vol.

(1) Nott and Gliddon, *Types of Mankind*. — Broca, Pruner-bey, *Bul. Soc. Anth.*, 1862. — Ameghino, *La Antiquidad del Hombre en el Plata*, t. I, p. 71.

(2) Topinard, *Rev. d'Anth.*, 1878, p. 511.

(3) Le lama (*Auchenia*), ruminant de la famille des Camélides. Il se rapproche du chameau par la structure particulière de son estomac. Son habitat est au sud de la Cordillère des Andes. Le guanaco et la vigogne sont des variétés de la même famille.

Populations
du Nouveau
Monde.
La Faune
et la Flore.