

# TRAVAUX ORIGINAUX

---

## Hémorrhagie rétro-placentaire survenue pendant la grossesse ;

par le docteur Médéric T. LAJOIE, de Nashua, N. H.,

membre de la *Société française d'Electrothérapie*, de la *Société d'Hygiène de Paris*, de la *New-Hampshire Medical Society*, etc.

Je tiens d'abord à bien spécifier que l'accident qui va nous occuper est connu depuis longtemps, et qu'il a été observé souvent, au moment de l'accouchement ou lorsque le travail est commencé depuis quelque temps. Mais comme beaucoup d'accoucheurs très distingués l'ont tout à fait nié pendant la grossesse, en dehors de tout travail, je vais rapporter des faits bien observés et qui seront concluants.

Voici trois observations prises à la Clinique Baudelocque, à Paris, dans le service du Prof. Pinard, et une autre qui nous fut rapportée par le professeur dans une leçon clinique, et remontant à 1884.

*Observation I.* 1884.—Une femme forte, bien portante, d'à peu près trente-neuf ans et arrivée au huitième mois de sa neuvième grossesse, alla hors des murs de Paris chercher des herbes pour ses lapins. Tout-à-coup, en se relevant, une poignée d'herbes à la main, elle ressentit une douleur vive dans le ventre, et presque immédiatement elle se sentit inondée de sang. Des maraîchers non loin de là vinrent à son secours et la portèrent dans leurs bras jusqu'à une des portes de Paris, où on la mit dans une voiture qui l'amena à Lariboisière vers midi. A son entrée ici, la femme était toute souillée, ses habits étaient complètement imbibés et les membres inférieurs tout dégoûtants de sang ; la face était pâle, les traits tirés, la respiration accélérée ; de plus il y avait des sueurs froides et des signes lipothymiques inquiétants. Des caillots emplissaient le vagin ; on fit le diagnostic d'hémorrhagie par insertion vicieuse du placenta, et ce pour diverses raisons : hémorrhagie survenant dans les derniers mois de la grossesse, sans cause apparente, chez une femme jusque là bien portante, etc ; bref on fit le tamponnement du vagin, mais les lipothymies se succédant rapidement, la faiblesse, la pâleur, les sueurs froides augmentant, la femme succomba trois heures après son entrée à l'hôpital.

A l'autopsie, on trouva que l'utérus se décortiquait parfaitement de l'œuf, et chose inouïe, l'œuf était *complètement décollé*, dans toute son étendue, des parois utérines, de sorte qu'il pouvait