

*Tænia de l'oie , Tænia anseris.*

Petit, très-aigu; la partie antérieure capillaire.  
*Goeze*, *Eingew.* tab. 29. fig. 1. *Encyclopédie*, pl. 45.  
 fig. 13, 14.

Se trouve dans les intestins de l'oie.

*Tænia du canard , Tænia anatis.*

Les articulations presque triangulaires; les stigmates latéraux, presque marginaux; la tête obtuse, souvent prenant la forme d'un marteau.

*Pallas*, *Beytr.* 1. tab. 2. fig. 23, et tab. 3. fig. 29.  
*Batsch*, *Bandw.* fig. 130. *Goeze*, *Eingew.* tab. 30.  
 fig. 1, 3. *Encycl.* pl. 46. fig. 1 à 3.

Se trouve dans les intestins des canards.

*Tænia uni , Tænia levis.*

La tête cylindrique; le cou très-mince et très-long; les articulations six fois plus larges que longues.

*Bloch*, *Eingew.* tab. 4. fig. 4, 6. *Batsch*, *Bandw.* fig. 126, 127.

Se trouve dans les intestins des canards, garot et souchet.

*Tænia cunéiforme , Tænia cuneata.*

La tête pointue, sessile; les articulations en forme de coin.

*Batsch*, *Bandw.* fig. 117, 118. *Bloch*, *Eingew.* tab. 3. fig. 1, 2.

Se trouve dans l'outarde et les canards macreuse et garot.

*Tænia du pingoin , Tænia alca.*

Les articulations avec des mamelons de chaque côté; le cou cylindrique.

Se trouve dans les intestins du pingoin.