

Jordbruk.

Nötköpa, använd som dragare eller till gödning.

Till dragare begagnas bland nötköpen egentligen oxar eller tjurar, och endast undantagsvis kor. Vid 3 års ålder kunna oxarna tanjas och användas till lindrigt arbete, men anses först vid 5 år hafva nått tillräcklig styrka och betskraft. Då de äro 9 å 10 år gamla, insätter man dem vanligen på gödning, hvarefter de slaktas, så fort de hunnit blifva tillräckligt feta och hulliga. Uppfödandet af dragoxar kan egentligen ej ske med någon fördel på andra ställen, än der vidsträckt betesmark finnes samt lätta kommunikationer för djurens af-sättning eller bortförande till marknadsplatserna. Skötseln och utfodringen är för öfrigt ungefärligen enahanda som för mjölkbo-skap, med undantag deraf att drauk, rotfrukter och andra myc- ket vattenhaltiga födoedel ej lampas sig rätt väl för dragdjur. För öfrigt måste födas mängd och beskaffenhet stå i förhållande till det mer eller mindre ansträng- ande arbete, som man fordrar att kreaturen skall uträtta. För ox- arnes främjande under vintern, då de ej användas så synneligen mycket till arbete, kan man be- gagna hufvudsakligen sådshalm jämte några få skålpund hö på dagen, för att bibehålla dem något lunda vid draghull. Då ox- arne användas till arbete under vintern, är ofta nödvändigt att låta sko dem, hvarvid är tillräck- ligt, om skor fastas endast å de yttre klafvorna. — Uppföder man nötkreatur uteslutande för göd- ning eller produktion af kött, så bör man naturligtvis helst för- skaffa sig sådana boskapsraser, hvilka utmärka sig genom en stor förmåga att hastigt och lätt anta ga gödning. För detta ändamål har man hos oss funnit den för- bättrade korthornsrasen vara syn- nerligen passande. Dessa djur äro vanligtvis fullvuxna vid 2½ å 3 års ålder. Om de gödas vid denna ålder för att såsom unga djur slaktas, lemna de ett kött af mycket högt värde. Naturligt- vis begagnas och mjölkboskapen till gödning och slagt, då kon ej längre lampar sig för mjölkpro- duktion. Hufvudsaken dervid är endast, att man gifver kreatu- ren en ymnig och kraftig föda, så att de snart blifva slagtfeta. Ol- jekakor, sådesgröpe, rotfrukter och afven drunk begagnas för gödning, och man låter dervid kreaturen få så mycket foder för hvarje dag, som de kunna förtära. Efter 4 å 5 månaders förlopp är gödningen vanligen fullbordad och djuren kunna föras till slagt- banken. Hos mycket fet och väl- gödd boskap utgör slagtvikten utom lever, lungor, blod och talg, omkring 50 å 60 proc. af den lef- vande kroppsvikten. Hudens vikt uppgår till 5 å 8 proc., af den lef- vande vigten. Köttet eger olika värde, då det samma tages från olika delar af djurkroppen. Si- lunda är köttet på bakkelen och bogarna af högre näringsvärde, än då det samma tages från halsen eller sidorna närmast under bu- ken. Vidare anmärkas, att kött

et efter fullständigt gödda krea- tur alltid är näringsrikare än ef- ter halffeta och magra djur. Det magra köttet kan innehålla ända till 70 proc. vatten, då däremot köttet efter fullgödda kreatur har en vattenhalt af endast 50 procent. Gödkalfvar uppfödas vanligen en- dast genom att gifva dem rikligen med mjölk, linfrösoppa, vassla och mjöldröck m. fl. andra för deras ålder passande och lättsmälta kraftfoderämnen. Vanligen lönar det sig icke att fortsätta gödning- en af kalvar längre än tills de blifva omkring 2 månader gamla, och man låter dem då utesluta- de dricka söt mjölk, 3 å 4 gånger om dagen, så mycket de kunna förtära. För att mjölken skall betala sig, måste gödkalven kun- na säljas till ett ganska högt pris.

Några korta anvisningar rörän- de skötseln af får, svin och andra mindre husdjur. För att med nå- gon fördel kunna idka fårskötsel, vare sig för produktion af ull el- ler kött, måste man ega lampiga betesmarker, som äro högländta och bevaxta med gräsarter, pas- sande för dessa kreatur. Derjam- te måste man utvalja sådana får- raser, hvilka lemna lätt säljbara produkter och föröfrigt tåla vid dei orten rådande klimatiska för- hållandena. Under vintern för- das fåren inne i ladugården med fint hö, säd, o jekakor och rotfruk- tar samt afvenledes med löf, som som för dessa djur utgör ett sär- deles passande födoedel. Då kreaturen skola gödas till slagt, så behöfver man naturligtvis gif- va dem en både kraftigare och rikligare föda, t. ex. utom hö af- ven säd och oljekakor. Ett får kan hinna gödas på 8-9 veckor. Fårhuset eller de kätter och rum, hvori fåren förvaras, måste vara rymliga och ljusa samt dörrarna breda och med afrundade dörr- poster. Under vintern böra få- ren utsläppas en eller annan gång i veckan, för att erhålla något friskare luft samt få tillfälle att röra sig mera fritt, än som kan ske inuti huset. Finuliga får klippas en gång om året; de grof- ulliga deremot vanligen tvänne gånger. Ett får af Merinosras lemna i medeltal 2½ kålp. tvättad ull. De större och gröfre köttfåren kunna deremot gifva från 5 till 8 skålpund tvättad ull. De finuliga fåren är mildre frukt- samma än de grofulliga och min- dre förädlade. Dessa senare fö- da ofta tvillingar, hvilket deremot sällan inträffar med de förra. Tackorna användas till afvel re- dan vid 1½ års ålder och kunna årligen lemna lam, tills de blifva 10 å 12 år gamla. Den bästa ål- dern för fårens gödning är emel- lertid 6 å 7 år. Slagtade vid den- na ålder lemna de det bästa kött- et. De bagglam, som icke be- höfvas för afvel, böra kastreras, och företages denna operation vanligen, då lammen äro 3 å 4 veckor gamla. Som lammen fö- da sig genom att dia modern, så bör man ej vidare besvär med skötseln eller uppfödandet af de späda djuren. Efter 3 månader kunna lammen afvansas eller skil- jas från mödrarna och uppfödas helt och hållet med fint hö eller stöpt säd. Då fårafveln bedrifves i större skala, kan den stundom vara ganska lönande; eljes brukar den på de flesta egendomar in- skränkas till produktionen af ull och kött för gårdens behof. — I afseende å svinkreaturskötsel anmärkas vi endast, att man kan

indela de olika svinslagen i tvän- ne större afdelningar, nämligen oförädlade och förädlade raser. De förra eller de egentliga landt- raserna utmärka sig genom lång- sträckt hufvud, smal hals, höga ben, smal rygg samt tjock hud, som är rikligen besatt med borst. De senare åter hafva kort hufvud, tjock hals, korta ben, tjock och bred rygg samt tunn och föra hårbeklädd hud. Landtraserna kunna under sommaren föda sig ute på åkrar, trädesfalt och i sko- gar, hvaremot de förädlade raser- na måste hela året om uppfödas inom hus. Dessa senare utveck- la sig hastigt och gifva fläk eller kött af utmärkt beskaffenhet, men de äro ej så hårdiga och frukt- samma som de förstnämnda svin- slagen. Som svinkreaturens dräg- tighetstid är jämförelsevis kort, så kan suggan vanligen framföda grisar tvänne gånger under lop- pet af ett år, och då antalet grisar hvarje gång kan uppgå till 12 å 15, så uppstår i hast en riklig af- komma efter svinkreatur, som skötas väl och användas till afvel. Uppfödandet och gödningen af svin lampar sig särdeles väl i sammanhang med mejeri- och brännerihandtering, emedan der vid erhålles en mängd affallspro- dukter, såsom skummjölk, vassla, drunk o. s. v., hvilka födoedelar äro passande för dessa djur. Sådes- gröpe, kokt potatis, affall från köken, färsk hästspilling samt en mängd andra olikartade äm- nen från väx- och djurriket an- vändas till svinföda. Om riklig och passande näring gifves, så kan ett svinkreatur vid 4 å 5 må- naders ålder uppnå en lefvande vikt af ända till 300 skålpund. Svinhusen böra vara så inrättade, att djuren hafva en något upp- höjd liggeplats, hvarjämte utanför huset måste finnas en afstängd plats eller s. k. svingård, der dju- ren allt emellanåt kunna gå ute och fritt röra sig. För att hindra suggan att skada eller ligga ihjäl grisarna, strax de blifvit födda, anbringa man speglar ås väg- garna rundt om liggeplatsen, så att suggan ej med ryggen kan kom- ma allt för nära väggen och ska- da grisarna. Hoarna, hvarur svinen erhålla fodan, förädlas af trä eller jeep, men böra hafva en sådan form, att de med lätthet kunna rengöras. Slagtvikten af val gödda svin, isynnerhet till hörande de förädlade och snabb- vuxna raser, är i allmänhet gan- ska hög. Inberäknar man däri afven lever, lungor, blod och de uttömda tarmarna, så kan slagt- vigten uppgå till något öfver 90 procent af djurets lefvande vikt. Svinkreaturen äro stundom utsat- ta för faror och sjukdommar, hvarför man alltid bör ega dem en noggrann skötsel och vård samt noga iakttaga de föreskrif- ter, som i dylika fall af djurläka- ren meddelas. — Till husdjursaf- velen hör afven fjäderfäskötsel, hvilken i många trakter torde kunna blifva ganska lönande, om den rätt bedrifves och de lokala förhållandena i öfrigt äro sådana, att de erhållna produkterna med lätthet kunna afyttras, såsom i närheten af de större städerna. Hufvudsakligen är, att man an- ordnar för dessa djur, såsom höns, ankor, gäss, kalkoner och duvor, lampiga hus eller rum, der de under vintern ej tåla skada genom inverkan af köld.

(Forts.)

Allan, Dominon & Beaver Linerna.

FRIBILJETTER från alla delar af de Skandinaviska landen och Finland säljas billigast af

W. P. F. CUMMINGS,

General Steamship Agent,

Care of C. P. R.

Office, WINNIPEG, MAN.

C. P. R. Land. GODT LAND hvarest Jordbruk lönar sig!

CANADA PACIFIC JÄRNVAGEN

har utmärkt land till salu i de bästa trakter af Canadas Nordvest. För att förenkla betalningssystemet har bolaget antagit följande: Summan å köpeskillingen och räntan delas i 10 delar enligt nedanstående tabell; den första inbetalningen göres vid köpet och den andra, ifall köparen genast bearbetar sitt land, två år efter köpet, den tredje tre år o. s. v. En person som ej odlar minst 16 acre det första året, är skyldig betala extra ränta det första året. Följande tabell visar de olika betalningarna å 160 acre pr år allt efter landets pris: —

första inbetalningen å					
160 acres å	\$3.00 pr acre	\$71.90	och nio årliga inbetalningar af	\$60	
do "	3.50 do	83.90	do	do	70
do "	4.00 do	95.85	do	do	80
do "	4.50 do	107.85	do	do	90
do "	5.00 do	110.85	do	do	100
do "	5.50 do	131.80	do	do	110
do "	5.00 do	143.8	do	do	120

Om landet betalas till fullo på en gång gifves 10% rabatt af den sum- ma, som öfverstiger första vanliga inbetalningen 6% ränta räknas förfall en betalningar.

OBS! Om ni ej är i tillfälle att köpa land så skrif efter våra pam- fletter och böcker som visa eder huru man försäkrar sig om ett HOMESTA af 160 acres (129 tunnland).

F. T. GRIFFIN.
C. P. R. Land Commissioner.

Skandinaviska bref besvaras på samma språk.

VESTRA CANADA.

Regeringens skörderapport för provinsen Manitoba utfärdad den 12 December 1899 innehåller följande intressanta statistik för året:

	Area under sådd	Medelskörd pr ac.	Summa bushels.
Hvete	1,629,995	17.13	27,922,230
Hafre	575,136	38.80	22,318,378
Korn	182,912	29.4	5,379,156
	Hela sådesproduktionen....		55,619,764
Potatis	19,151	168.5	3,226,395

KREATURSAFVELN.

Af slaktdjur exporterades under året.....	12,000 st.
Boskapsuppfödare afslände under året.....	35,000 st.
Totala värdet af mejeriprodukter för året	\$470,559.09

10,500 farmarbetare anställda från östern för att arbeta på skörderfältet, och behöfvat af arbetskraft blef knappast ändå fylldt.

Beräknade omkostnader på farmhus under året.....\$1,000,000

Land kan köpas i nästan alla delar af provinsen på lätta betalnings villkor. Priserna vexla från \$2.00 och uppåt.

FRIA HOMESTEAD.

Äro ännu tillgängliga i många delar af provinsen, såväl som i de närgrän- ande distrikten i Assiniboia, Alberta och Saskatchewan.

Exkursionstariffer för nybyggare till Vestra Canada erhållas alla platser i Förenta Staterna tillsammans med alla upplysningar om huru att tillförsäkra sig en FRI FARM i det stora hvete-odlingsbältet om anhallan därom insändes till Superintendent of Immigration, Ottawa Canada.

Skrif till hvilken som helst af Regeringens Agenter i Förenta Staterna eller

F. PEDLEY,

Superintendent of Immigration.

Ottawa, Canada

Prenumerera på Canada.