

SCORBUT INFANTILE

—

(Maladie de Barlow)

1^o Dès que le diagnostic sera posé, supprimer le lait stérilisé ou modifié (lait condensé, lait humanisé, etc.), et les farines alimentaires dont l'usage exclusif a déterminé l'écllosion du mal, et modifier radicalement l'alimentation :

A l'enfant de moins de six mois, on donnera du lait frais recueilli aussi aseptiquement que possible de façon à pouvoir être consommé cru; en même temps, on lui fera prendre deux ou trois fois par jour un cuillerée à café de jus d'orange ou de citron.

A l'enfant plus grand, on donnera outre le lait frais; des purées de pommes de terre, deux ou trois cuillerées à café de suc de viande pressée, et quelques cuillerées de jus de fruits frais: orange, citron, raisin, cerise ou prune.

Cette alimentation sera continuée pendant un mois environ, après quoi l'enfant sera remis au régime normal de son âge en continuant à éviter de façon absolue l'emploi du lait stérilisé ou de tout aliment de conserve.

2^o Eviter le plus possible de remuer l'enfant, à cause des douleurs que provoque le moindre attouchement. Le laisser à plat dans un berceau ouaté, les membres enveloppés d'une épaisse couche de coton; mais le faire vivre le plus possible au grand air, en aérant largement les pièces qu'il occupera ou en transportant son berceau dans un jardin.

3^o Faire prendre trois fois par jour une cuillerée à café de la solution suivante:

Citrate de soude	5 gr.
Eau distillée	300 cc.