

La cocaïne se donne en potion ou en pilules, 0.01 à 0.05. On peut l'associer à la morphine ou à l'antipyrine.

Toute la série des opiacés est d'usage courant : extrait thébaïque, 0.05 à 0.15; laudanum de Sydenham, 15 à 25 gouttes dans un peu d'eau sucrée; la morphine, 0.01 à 0.05 par 24 heures; la belladone, la teinture d'iode, 5 gouttes, de $\frac{1}{2}$ en $\frac{1}{2}$ heure jusqu'à 10 ou 15 gouttes. Dans les vomissements de la grossesse Huchard donne :

Tr. Iode	} à 5 gr.
Chloroforme	

5 gouttes matin et soir au moment des repas.

L'eau chloroformée, très efficace, se donne par cuillérées à soupe.

La créosote, 0.50; l'éther très employé en potion ou en perles. La strychnine réussit surtout dans les vomissements des tuberculeux :

Strychnine	0.01 gr.
Alcool	1. "
Eau distillée	100. "

Outre ces médications, il existe des moyens externes : révulsion au niveau du creux épigastrique, compresses froides ou chaudes, pulvérisations d'éther, le chlorure d'éthyle ou de méthyle, cataplasmes chauds avec laudanum, etc.

Chez certains tuberculeux, le gavage à la sonde calme les vomissements. La sonde affaiblirait la sensibilité des filets pharyngo-oesophagiens du pneumogastrique. Les inhalations d'oxygène seraient précieuses chez quelques malades de même que les badigeonnages du pharynx avec une solution cocaïnée à 1/20. La morphine agit sur le bulbe qui commande aux vomissements.

On emploie encore l'électricité.

Vomissements d'origine réflexe à point de départ stomacal :—Toutes les affections stomacales peuvent s'accompagner de vomissements.

L'embaras gastrique et l'indigestion s'accompagnent de vomissements ou d'efforts qui sont à respecter. Ce sont des aliments ou des boissons dont l'estomac veut se débarrasser et dont il faut favoriser l'évacuation.

Au début d'une indigestion, on peut quelque fois empêcher les vomissements en excitant la muqueuse stomacale par une infusion chaude : camomille, thé, liquides gazeux, un peu d'alcool.

Les vomissements installés, il faut les aider par les titillations de la luette, les boissons tièdes ou salées, ou en donnant un émétique, généralement le sirop d'ipéca avec un peu de poudre.

Sirop d'ipéca	30 gr.
Poudre d'ipéca	0.30 à 1 gr.

Une cuillérée à dessert à 1 cuillérée à soupe à répéter à toutes les 10 minutes jusqu'aux vomissements.

S'il y a urgence, on peut encore aider par un lavage d'estomac.

Dans la gastrite éthylique, les vomissements sont de règle. Pour les combattre, on proscriera l'alcool sous toutes ses formes et le lait et les