

LA CYSTITE AIGÜE CHEZ LA FEMME

La cystite aiguë chez la femme est causée par différents agents bactériens, des corps étrangers, des traumatismes, la rétention d'urine, le cathétérisme malpropre, le froid, etc. Les symptômes sont le miction fréquente, le ténesme et une sensation de brûlure au passage de l'urine, douleur vésicale, hématurie, pyurie.

On peut avoir en plus des frissons, un pouls accéléré, de la fièvre, de la céphalalgie.

Le traitement comporte le repos, l'administration du sanmetto à l'intérieur, de l'eau fraîche et du lait en abondance, une alimentation simple et non irritante, des purgatifs salins, des bains de siège et des douches vaginales. Enfin des lavages de la vessie avec des solutions antiseptiques et des instillations de nitrate d'argent.

— Dans les hypertrophies de la prostate où le lobe médian n'est pas augmenté de volume le malade peut vivre longtemps à l'aise. Avec un régime bien suivi, du sanmetto, quelques bains de siège chaud, il sera mieux en gardant sa prostate qu'en courant le risque d'une opération toujours hasardeuse, parce que l'on n'est jamais sûr de recouvrer après une intervention. En effet les cas les plus bénins en apparence voient apparaître après l'opération l'urémie et la mort.