

Informations Scientifiques

Fièvre cérébro-spinale. — Cette maladie apparaît épidémi-
quement surtout en Amérique. On connaît les épidémies de
1805, 1837, 1850 et 1901. Dans les deux dernières années, on
a compté dans l'Etat de New-York environ 4.000 cas
avec plus de 3.000 décès. La mortalité moyenne est de 50 à
75 %. Dans tous les cas examinés, on a trouvé le Diplococ-
cus intracellularis de Weichselbaum.

M. Farroni a observé un cas d'anémie pernicieuse bien
caractérisée par les symptômes cliniques et par les anoma-
lies constatées à l'examen du sang, cas dans lequel, après
insuccès des moyens habituels, la guérison fut obtenue grâce
aux injections intraveineuses de sublimé.

Lorsque l'albuminurie n'est que symptomatique d'une
congestion ou du début d'une lésion rénale, la saignée de
la veine pédieuse préconisée par M. le professeur Bacelli a
été suivie des meilleurs résultats.

*Traitement de la constipation par la suppression de la
viande.* — M. le Dr Kohustamm a obtenu d'excellents résul-
tats dans tous les genres de constipation en prescrivant le
régime suivant : 7 heures du matin, potage au gruau
d'avoine ; 9 heures, 8 onces de cacao avec pain beurré et
miel ; 11 heures, 8 onces de cacao avec fruits ou un œuf
ou pain beurré ; 1 heure soir, bouillon, salade et pommes de
terre, légumes avec œuf, compote, pudding, 8 onces de lait,
1/2 once de beurre ; 4 heures soir, 8 onces cacao, pain, beurre
et fruits ; 7 heures et demie soir, salade et œufs, compote,
soufflé, 8 onces de lait, 1/2 once de beurre.

L'ingestion de beurre en quantité prescrite est indispen-
sable pour la réussite de la cure.

L'Allemagne donne une morbidité de syphilis de 5,7 pour
1.000 soldats ; la Belgique, de 6,7 pour 1.000 ; la France
(avec l'Algérie), 6,8 pour 1.000 ; la Bavière, de 9 pour 1.000 ;
la Russie, de 12 pour 1.000 ; l'Italie, de 13 pour 1.000 ; la Rou-
manie, de 16 p. 1.000 ; l'Autriche, de 19 pour 1.000 ; l'An-
gleterre, troupes métropolitaines, de 75 pour 1.000, troupes
coloniales, de 139 pour 1.000.