

2. Gen. COTURNICULUS, Bonaparte.

Bec court, fort et large à la base. Ailes courtes, dépassant à peine la base de la queue ; les tertiaires presque aussi longues que les primaires. Queue courte et étroite, un peu plus échancrée au milieu, mais graduellement arrondie sur les côtés, les pennes lancéolées et aigües, mais non raides, comme dans le genre précédent. Tarses plus longs que le doigt médian.

Le Pinson de Henslow. *Coturniculus Henslowi*, Bonap. *Emberiza*, Aud. *Fringilla*, Nutt.—Vulg. *Le Pinson aux ailes jaunes*. Angl. *Henslow's Bunting*.—Longueur $2\frac{1}{2}$ pouces ; ailes $2\frac{1}{2}$; queue $2\frac{1}{2}$. Dessus d'un jaune brun, le cou et la partie antérieure du dos teints de verdâtre. Couronne avec une large bande tachetée de noir de chaque côté. Un croissant obscur en arrière des oreilles. Les tertiaires, le croupion, et les pennes caudales, d'un brun foncé au centre. Ailes bordées de jaune. Dessous d'un jaune brunâtre pâle avec des lignes noires sur la poitrine et les côtés.

E. et R.R. D'après Mr. LeMoine, ce Pinson se rencontrerait aussi parfois en Canada.

3. Gen. ZONOTRICHIA, Swainson.

Bec conique, un peu comprimé, légèrement échancré ; commissure presque droite. Ailes moyennes, n'atteignant pas le milieu de la queue, les 2^e et 3^e rémiges les plus longues ; tertiaires et secondaires à peu près égales et plus courtes que les primaires. Queue courte, légèrement arrondie. Des stries en dessus seulement.

Deux espèces dans notre faune.

1. Le Pinson à couronne blanche. *Zonotrichia leucophrys*, Swains. *Fringilla*, Aud. *Emberiza* Forst.—Angl. *White-crowned Sparrow*.—Longueur $7\frac{1}{2}$ pouces ; ailes $3\frac{1}{2}$. Dessus de la tête noir, séparé en deux par une bande blanche ; la moitié supérieure des lores avec une ligne à travers l'œil jusqu'à l'occiput, aussi noires ; paupière inférieure blanche. Deux bandes blanches sur les ailes ; bords des tertiaires d'un brun chataigne. Côtés de la tête, haut de la poitrine, et le bas du cou tout autour, d'un cendré pâle, passant au blanchâtre sous le ventre. Région interscapulaire portant de nombreuses lignes brunes interrompues.

P. et AC. Ce Pinson qui est assez commun ici au printemps ne s'y rencontre plus en été. Il niche au pied des arbres et pond 4 œufs de couleur chocolat.