

7° La colique terminée, on administre pendant quelques jours le miel-soufré :

Soufre	} aa 50 gr.
Miel	

prendre chaque jour une à deux cuillerées à soupe.

L'emploi du soufre est justifiée par ce fait qu'il agit en neutralisant le plomb à la surface de l'intestin et forme avec lui un composé insoluble et par suite inoffensif de sulfure de plomb.

Simultanément, on conseille de prendre tous les deux jours un bain sulfureux (100 grammes de polysulfure de potassium par bain).

Il reste à indiquer aux malades les mesures prophylactiques qui leur permettront d'éviter le retour des coliques de plomb : vêtements spéciaux pour le travail, nettoyage fréquent des mains, de la bouche et des dents, bains sulfureux. Le lait tiendra une grande place dans l'alimentation et l'on recommandera surtout de ne pas abuser des boissons alcooliques.

Trinitrine et vératrum viride dans l'hypertension artérielle, par le Dr Adoyphe Бачи, dans *La Clinique*, 21 juillet 1911.

Le *vératrum viride* (colchicacée) a la propriété de rabaisser la tension artérielle et de dilater les artères. On peut s'en servir sous forme de *teinture* (teinture de *vératrum viride*) dans certaines affections du cœur, dans certaines maladies de l'appareil circulatoires, dans l'artério-sclérose, peut-être encore, avec succès, dans l'angine de poitrine, qui, on le sait, serait occasionnée par un rétrécissement ou l'oblitération des artères coronaires. Son action paraît être aussi efficace que la *trinitrine* (syn.: nitro-glycérine) préconisée surtout par Huchard et employée en solution alcoolique au 1/100e ou en injection hypodermique dans les lésions artério-scléreuses, dans l'angine de poitrine, dans les affections cardio-vasculaires à tension artérielle élevée.

On se rappelle les formules usitées par Huchard :

1° Soluté alcoolique de trinitrine au 1/100e. XXX à XL gouttes.
Eau distillée 300 cent. cubes.

Dose : 3 cuillerées à soupe par jour.

ou bien :

2° Solution alcoolique de trinitrine au 1/100e II, III à IV gouttes p. jour.

ou bien :