

Le plus souvent, cependant, l'inoculation de l'ecthyma est cutanée, externe.

Elle se fait par le grattage, nos doigts n'étant jamais chirurgicalement propres.

Qu'un sujet soit porteur d'un eczéma, d'un prurigo chronique, d'une phthiriasse, il s'inoculera très bien les microbes de l'ecthyma. Il sera particulièrement exposé, s'il est galeux et malpropres : c'est chez les malpropres que la *gale pustuleuse ecthymateuse* se développe.

Toute excoriation cutanée, toute éruption artificielle de cause externe peut servir de porte d'entrée au mal. Et l'*ecthyma professionnel* se rencontre chez les gens qui manient des substances irritantes et septiques, des matières organiques putréfiées. On l'observe chez les garçons d'écurie, les cochers, les cuisiniers, les laveurs de vaisselle, les vétérinaires, parfois chez les médecins. Ces ouvriers, en effet, sont tous en contact avec les déjections animales.

Enfin, l'inoculation obthymateuse est favorisée par la débilite du sujet chez le vieillard, chez le cachectique, l'alcoolique, le misérable (*ecthyma cachectique*). La même débilite favorable se rencontre chez certains enfants et crée un terrain propice à l'*ecthyma infantile* dont les caractères sont spéciaux.

Comme ecthymas de cause externe, nous avons donc l'ecthyma simple, l'ecthyma cachectique, l'ecthyma infantile.

L'*ecthyma simple* survenant chez des individus bien portants, à la suite de l'inoculation ecthymateuse d'un prurigo, par exemple, ou d'une dermite artificielle, d'une lésion de la peau de cause externe, est bénin. Presque superficiel, il guérit vite et ne se reproduit pas, si on supprime les causes morbides auxquelles étaient exposés les malades.

Avec les mêmes microbes que l'ecthyma simple, l'*ecthyma des débilites* est plus grave. Siégeant aux jambes, aux cuisses, ses pustules sont volumineuses, ses croûtes sont épaisses ; ses ulcérations rebelles, lentes à cicatriser, ont parfois un caractère gangréneux ; ses cicatrices sont profondes particulièrement sur les membres et quand elles sont pigmentées se rapprochent beaucoup de celles de la syphilis : c'est alors qu'il est bon de se rappeler que toutes les cicatrices pigmentées ne sont pas d'origine syphilitique.

L'ecthyma simple et l'ecthyma cachectique se ressemblent : ils diffèrent de l'*ecthyma infantile*. Celui-ci se voit chez les très jeunes enfants mal nourris, débiles, chez les athreptiques de Par-