sence de consentement de la femme dans un acte de possession plus ou moins complet ; et cela est si vrai, que, dans le sens de la loi, il peut y avoir viol même sur une fille publique.

L'état de la membrane ne constitue qu'un des éléments qui peuvent fournir à l'instruction quelques déductions, et il est bien d'autres considérations dont on doit tenir compte : ainsi s'assurer de l'absence d'ecchymoses, rechercher des traces de sperme, etc.

TRAITEMENT MEDICAL DES ADENOPATHIES TUBERCULEUSES

PAR M. LE DOCTEUR SÉBILEAU.

1o Se lever, chaque matin, d'assez bonne heure, pour faire, avant de commencer son travail, une promenade à pied, d'au moins une heure ;

2o Après cette promenade, prendre un tub froid et faire ensuite, sur tout le corps, une friction sèche avec un gant de crin ; déjeuner avec lait bouilli, pain, œufs, beurre ;

3o Travailler dans une pièce exposée au soleil (bain de soleil) ; avoir soin de laisser la fenêtre toujours ouverte ou d'aérer la pièce le plus fréquemment possible ;

4o Courte promenade à pied avant et après déjeuner ;

5o Alimentation avec viandes bien cuites (rôties ou grillées), poissons, lait bouilli, œufs ; utiliser des féculs et des aliments gras quand ceux-ci sont bien supportés ;

6o Avant le dîner, si possible, nouvelle promenade d'au moins une heure ;

7o Coucher dans une chambre dont une fenêtre au moins sera ouverte jour et nuit, hiver comme été, mais s'y garer du froid et du courant de l'air ;

8o Avant le coucher, faire sur tout le corps une friction à l'alcool, après une séance d'exercices d'assouplissement des membres et du tronc (gymnastique suédoise) ;

9o Le matin, au lever, prendre, dans un quart de verre d'eau stérilisée, quatre gouttes de :

Liqueur de Fowler.... . 4 drachmes

Etiquetez : *Poison*. Augmenter chaque jour d'une goutte jusqu'à concurrence de dix. Diminuer ensuite d'une goutte par jour jusqu'à quatre gouttes. Suspendre huit jours et recommencer ensuite de la même manière ;