

Hyperidrose des pieds.—*Duhring.*

R.—Oléate de zinc.....	3ii
Amidon.....	} aa 3iii
Talc.....	

M.—En saupoudrer les pieds qu'on aura préalablement lavés à la teinture de belladone.—*N.-Y. Med. Record.*

Séborrhée.—*G. H. Fox.*

1 ^o R.—Sulphur. lot.....	part 8
Balsam peruv.....	" 2
Petrolat.....	" 40

M.—Usage local.

2 ^o R.—Zinci sulph.....	part 3
Pot. sulph.....	" 2
Spt. vini.....	" 10
Aq. rosæ.....	" 100

M.—En applications au coucher.—*Nashville Journ. of Med. and Surg.*

Eczéma.—*Dr H. E. Dykeman.*

R.—Hydrarg. chlorid. mit.....	gr xxx
Adipis.....	5i

M.—Faites un onguent. Usage local.

Urticaire.—*Dr. J. B. Johnson.*

R.—Ammon. bromid.....	3ii
Aquæ.....	3vi

M.—Dose : Une cuillerée à soupe toutes les trois heures.

Alopécie.—*Dr. Rose.*

R.—Ammon carb.....	3i
Tr. capsici.....	3i
Spt. vini.....	} aa 3i
Glycerinæ.....	
Aq. rosæ.....	3viii

M.—En lotions, matin et soir.

Prurit localisé.—*Duhring.*

R.—Ung. cetacei.....	3i
Hydrarg. chlorid. mit.....	3ss
Extr. belladon.....	3i

M.—Usage local.—*Canadian Practitioner.*

Poudre escharotique.—*Esmarch.*

R.—Acide arsénieux.....	1 partie
Sulfate de morphine.....	1 "
Calomel.....	8 parties
Poudre d'acacia.....	48 "

M.—À appliquer sur les tumeurs superficielles, verrues etc., ayant soin de mettre, au préalable, la surface à nu au moyen d'un bistouri ou d'un vésicatoire.—*Southern Practitioner.*