

neis; pedibus, antice, ferrugineis, postice, pallide auratis; tarsis nigricantibus; pulvillis ferrugineis.—Longit. 23 millim.

“ Esta bella especie parece casi idéntica al *C. picta* de Fabr. (*Syst. Nat.*), aunque la descripción que ha dado este autor sea demasiado incompleta para servir á resolver la duda. Por otra parte, nos parece diferir bastante del *C. picta* de Wiedmann (*Ins. Zweiflugs., Ins.*), para autorizarnos á proponerla como nueva. Tal vez así no ofrezca mas que una variedad occidental.”

*Conops brachyrhynchus* Mac., Dipt. Exot., ii. 3, 15, 13.

Long. 51. ♂. Trompe assez courte, ne dépassant pas le premier article des antennes. Face et front jaunes. Ce dernier brunâtre au milieu. Antennes peu divergentes; premier article testace; deuxième et troisième noirs, d'égale longueur. Thorax et abdomen noirs; deuxième segment de ce dernier à bord postérieur testacé. Pieds testaces; jambes à base jaune et anneau brun au milieu; tarses bruns. Balanciers testaces. Ailes brunées, bord interieur brunâtre; première cellule postérieure, discoidale et anale assez claires, nervure terminale de la discoidale oblique. Amérique Septentrionale. M. Bastard.

*Conops flaviceps* Mac., loc. cit., 15, 14.

Long. 3½ l. ♀. Noir. Face et front jaunes; vertex fauve. Antennes; noirs, massue testacea en-dessous; troisième article court. Thorax à épaules et tache contigüe en arrière testacea; cuissot et métathorax noirs. Abdomen à petiole très-court; premier segment noir; deuxième et partie antérieure du troisième fauves; le reste de ce segment, quatrième et cinquième noirs en-dessus, sixième fauve, à duvet d'un gris jaunâtre pâle, bord postérieur des troisième, quatrième et cinquième à duvet semblable. Pieds fauves; hanches noires, jambes à partie antérieure jaune, les quatre derniers articles des tarses noirâtres. Ailes à large bord externe brun, terminé carrement, une petite tache brune à l'extremite. De l'Amérique Septentrionale.

*Conops fulvipennis* Mac., loc. cit., 13, 10.

Long. 7 l. ♀. Face jaune; partie supérieure de la carene noire, partie inférieure des joues noires. Front fauve à bord des yeux jaune et bord intermédiaire noire. Antennes testacea. Thorax noir, épaulettes brunes, deux petites taches de duvet jaunâtre en-dedans de ces derniers. Abdomen noir, segments bordés postérieurement de duvet