

fs glabris, junioribus subtus rubiginoso-pubescentibus. W.

Ficus rubiginosa. Desf. *catal. hort. parif.* 209.

Südliche Feige. W.

Habitat in Nova Hollandia. f. (v. v.)

Folia tri- vel quadripollicaria elliptica utrinque rotundato - obtusa integerrima, supra saturate viridia glabra, subtus in venis pilosiuscula, juniora subtus pilis rubiginosis tecta. Receptacula calyculata sessilia geminata pubescentia. W.

* 27. *FICUS stipulata.*

F. foliis ovatis obtusis integerrimis cordatis basi inaequalibus, stipulis membranaceis geminatis persistentibus, caule repente. W.

F. foliis oblique cordatis obtusis glabris, caule decumbente squamoso. Thunb. *diff. de Ficu.* n. 7.

F. (*scandens*) foliis cordatis integris basi inaequalibus subtus venoso-reticulatis, stipulis lanceolatis oppositis, caulibus scandentibus. Lam. *encycl.* 2. p. 493.

Kletternde Feige. W.

Habitat in China, Japonia. f. (v. v. f. fl.)

Ramuli et Petioli pilosi. Folia glabra unguicularia vel pollicaria. Caulis more *Hederæ* in muris arborumque truncis repens. W.

* 28. *FICUS punctata.*

F. foliis oblongis emarginatis glabris subtus punctatis, caule flexuoso radicante. Thunb. *diff. de Ficu.* n. 9.

Punctirte Feige. W.

Habitat in India orientali. f.

Caulis parasiticus longe scandens flexuosus teres rugosus brunneus, crassitie vix calami scriptorii. Rami flexuosi laeves brunnei. Ramuli brevissimi. Folia oblonga obtusa obsolete emarginata integra, margine parum reflexo, glabra, supra laevia subtus impresso-punctata, patentia et reflexa, unguicularia usque pollicaria. Petioli brevissimi. Fructus obovati, magnitudine fere *F. Caricae*. Thunb. l. c.

29. *FICUS trigona.*

F. foliis ellipticis integerrimis obtusis glabris, receptacu-