

漢城獨行賊劫銀行  
挾持人質與警對峙  
警察衝入銀行將他拘捕

【路透社漢城三日電】警方今天說，他們迅速地結束了一場人質戰。此間一家銀行的四名僱員被一個獨行賊挾持，索取五萬元贖金。在事發三個半鐘頭後，四個男子和十二個女人，警方衝進該銀行，拘捕了一個挾持人質的男子，所有人員隨即獲得釋放，沒有人受傷。

## 漢城獨行賊劫銀行 挾持人質與警對峙

# 後以煙戒者煙香吸 低降率亡死病臟心 告報究研家專司公健保撒凱

檢者  
的  
後  
告  
研  
究  
家  
專  
司  
公  
健  
保  
撒  
凱

為何煙戒者煙香吸  
低降率亡死病臟心  
告報究研家專司公健保撒凱

性長命，這是實在  
的，但是這  
個問題，現在却成爲醫學工  
作者和科學家研究的對象。



有人問我：「  
為什麼女性較男  
性長命？」

婦女壽命較男  
性長，這是實在  
的，但是這

個問題，現在却成爲醫學工  
作者和科學家研究的對象。

根據美國的統計，婦女一  
般要比男子長壽五年，甚至  
六至八年，而且還有繼續增  
長的趨勢。

醫學家認爲，這種原因是  
多方面的，例如自然因素是  
生活方式，周圍的環境和個  
人的習慣的影響，都起着一定  
的作用，也有人將這種男女壽  
命的差別，歸因於男人喜愛  
吸煙、飲酒和縱慾，在工  
作中更多接觸到對身體有害  
的物質等。

可是，在現代的社會裡，  
女性吸煙和飲酒，又何嘗不  
易越來越多？

不過，更多的男性死於自  
殺、戰爭、軍事和謀殺，如  
是事實。

美國的醫學家曾來博士的研  
究顯示，心血管病是男人的  
特別是對卅五歲以上男性的最大  
健康威脅之一，而婦女直到更年

期為止，都能較有效地防患此病  
。這是因爲婦女的機體中，產生  
的前列腺素比較男子機體中多的  
緣故。動脈粥樣硬化的特點之一  
是血管狹窄，男子對於腎上腺素  
促使血管狹窄的其他物質的  
反應，比婦女強烈，便容易  
得此病。

富來博士的研究又發現，  
男女性的染色體構造大有差  
別。

他認爲，婦女的一對性染  
色體是互相關連的，當其中  
一個染色體中有致命的基因  
出現，那末，第二個染色體  
也是男性因面而致命的。

另外，富來博士的研究又  
指出，男女性的性激素也有  
性差別。

在性成熟時，激素分泌增  
加，男性大量分泌睪酮，女  
性則分泌雌激素和孕納。

這就是男性因面而致命的  
原因之一。

目前，各國的科學家們，正為  
性比女性短命的原因而作出種  
種研究，據說並已取得一些進展。  
這些研究，成功之後大抵將有  
助於今後延長男子的壽命的了。

【華盛頓郵報】據凱撒保險公司專  
家的研究報告中說，戒烟的人的心  
臟病死亡率較戒菸者的臟病死亡  
率大二點二倍。這項研究的佛德曼博  
士說，實際上，戒烟的人的心  
臟病死亡率減少一半以上。

此項研究報告是根據對七、六五  
個長期吸烟者在經過長期吸烟後已戒  
烟，較從未吸烟者的心臟病死亡  
率低了百分之十二左右。

佛德曼對於這一事實的理由不能  
加以說明，但是他提到，一切原因  
（不只心臟病，並包括癌症）的死  
亡率在長期吸烟者當中最高，而在  
從不吸烟者當中最低，而戒烟者的  
死亡率僅大於從不吸烟者。

佛德曼的研究結果與其他研究者  
的結果互相衝突，其他研究者說，  
某些其他因素而並非吸烟使吸烟者

者容易患心臟病。

他說，他曾對三五、九十七名男女的  
分析，這些人自一九六四年以來曾在三藩市及居留的凱撒  
保險公司進行健康檢查。

他說，此項研究報告於二月間在美國心臟協會會議中發  
表，但是統計數字並未公開，直到該協會對此項報告加以  
檢討之後。

【聯合新聞網】據凱撒保險公司專  
家的研究報告中說，戒烟的人的心  
臟病死亡率較戒菸者的臟病死亡  
率大二點二倍。這項研究的佛德曼博  
士說，實際上，戒烟的人的心  
臟病死亡率減少一半以上。

此項研究報告是根據對七、六五  
個長期吸烟者在經過長期吸烟後已戒  
烟，較從未吸烟者的心臟病死亡  
率低了百分之十二左右。

佛德曼對於這一事實的理由不能  
加以說明，但是他提到，一切原因  
（不只心臟病，並包括癌症）的死  
亡率在長期吸烟者當中最高，而在  
從不吸烟者當中最低，而戒烟者的  
死亡率僅大於從不吸烟者。

佛德曼的研究結果與其他研究者  
的結果互相衝突，其他研究者說，  
某些其他因素而並非吸烟使吸烟者

者容易患心臟病。

他說，他曾對三五、九十七名男女的  
分析，這些人自一九六四年以來曾在三藩市及居留的凱撒  
保險公司進行健康檢查。

他說，此項研究報告於二月間在美國心臟協會會議中發  
表，但是統計數字並未公開，直到該協會對此項報告加以  
檢討之後。

【聯合新聞網】據凱撒保險公司專  
家的研究報告中說，戒烟的人的心  
臟病死亡率較戒菸者的臟病死亡  
率大二點二倍。這項研究的佛德曼博  
士說，實際上，戒烟的人的心  
臟病死亡率減少一半以上。

此項研究報告是根據對七、六五  
個長期吸烟者在經過長期吸烟後已戒  
烟，較從未吸烟者的心臟病死亡  
率低了百分之十二左右。

佛德曼對於這一事實的理由不能  
加以說明，但是他提到，一切原因  
（不只心臟病，並包括癌症）的死  
亡率在長期吸烟者當中最高，而在  
從不吸烟者當中最低，而戒烟者的  
死亡率僅大於從不吸烟者。

佛德曼的研究結果與其他研究者  
的結果互相衝突，其他研究者說，  
某些其他因素而並非吸烟使吸烟者

者容易患心臟病。

他說，他曾對三五、九十七名男女的  
分析，這些人自一九六四年以來曾在三藩市及居留的凱撒  
保險公司進行健康檢查。

他說，此項研究報告於二月間在美國心臟協會會議中發  
表，但是統計數字並未公開，直到該協會對此項報告加以  
檢討之後。

【聯合新聞網】據凱撒保險公司專  
家的研究報告中說，戒烟的人的心  
臟病死亡率較戒菸者的臟病死亡  
率大二點二倍。這項研究的佛德曼博  
士說，實際上，戒烟的人的心  
臟病死亡率減少一半以上。

此項研究報告是根據對七、六五  
個長期吸烟者在經過長期吸烟後已戒  
烟，較從未吸烟者的心臟病死亡  
率低了百分之十二左右。

佛德曼對於這一事實的理由不能  
加以說明，但是他提到，一切原因  
（不只心臟病，並包括癌症）的死  
亡率在長期吸烟者當中最高，而在  
從不吸烟者當中最低，而戒烟者的  
死亡率僅大於從不吸烟者。

佛德曼的研究結果與其他研究者  
的結果互相衝突，其他研究者說，  
某些其他因素而並非吸烟使吸烟者

者容易患心臟病。

他說，他曾對三五、九十七名男女的  
分析，這些人自一九六四年以來曾在三藩市及居留的凱撒  
保險公司進行健康檢查。

他說，此項研究報告於二月間在美國心臟協會會議中發  
表，但是統計數字並未公開，直到該協會對此項報告加以  
檢討之後。

【聯合新聞網】據凱撒保險公司專  
家的研究報告中說，戒烟的人的心  
臟病死亡率較戒菸者的臟病死亡  
率大二點二倍。這項研究的佛德曼博  
士說，實際上，戒烟的人的心  
臟病死亡率減少一半以上。

此項研究報告是根據對七、六五  
個長期吸烟者在經過長期吸烟後已戒  
烟，較從未吸烟者的心臟病死亡  
率低了百分之十二左右。

佛德曼對於這一事實的理由不能  
加以說明，但是他提到，一切原因  
（不只心臟病，並包括癌症）的死  
亡率在長期吸烟者當中最高，而在  
從不吸烟者當中最低，而戒烟者的  
死亡率僅大於從不吸烟者。

佛德曼的研究結果與其他研究者  
的結果互相衝突，其他研究者說，  
某些其他因素而並非吸烟使吸烟者

者容易患心臟病。

他說，他曾對三五、九十七名男女的  
分析，這些人自一九六四年以來曾在三藩市及居留的凱撒  
保險公司進行健康檢查。

他說，此項研究報告於二月間在美國心臟協會會議中發  
表，但是統計數字並未公開，直到該協會對此項報告加以  
檢討之後。

【聯合新聞網】據凱撒保險公司專  
家的研究報告中說，戒烟的人的心  
臟病死亡率較戒菸者的臟病死亡  
率大二點二倍。這項研究的佛德曼博  
士說，實際上，戒烟的人的心  
臟病死亡率減少一半以上。

此項研究報告是根據對七、六五  
個長期吸烟者在經過長期吸烟後已戒  
烟，較從未吸烟者的心臟病死亡  
率低了百分之十二左右。

佛德曼對於這一事實的理由不能  
加以說明，但是他提到，一切原因  
（不只心臟病，並包括癌症）的死  
亡率在長期吸烟者當中最高，而在  
從不吸烟者當中最低，而戒烟者的  
死亡率僅大於從不吸烟者。

佛德曼的研究結果與其他研究者  
的結果互相衝突，其他研究者說，  
某些其他因素而並非吸烟使吸烟者

者容易患心臟病。

他說，他曾對三五、九十七名男女的  
分析，這些人自一九六四年以來曾在三藩市及居留的凱撒  
保險公司進行健康檢查。

他說，此項研究報告於二月間在美國心臟協會會議中發  
表，但是統計數字並未公開，直到該協會對此項報告加以  
檢討之後。

【聯合新聞網】據凱撒保險公司專  
家的研究報告中說，戒烟的人的心  
臟病死亡率較戒菸者的臟病死亡  
率大二點二倍。這項研究的佛德曼博  
士說，實際上，戒烟的人的心  
臟病死亡率減少一半以上。

此項研究報告是根據對七、六五  
個長期吸烟者在經過長期吸烟後已戒  
烟，較從未吸烟者的心臟病死亡  
率低了百分之十二左右。

佛德曼對於這一事實的理由不能  
加以說明，但是他提到，一切原因  
（不只心臟病，並包括癌症）的死  
亡率在長期吸烟者當中最高，而在  
從不吸烟者當中最低，而戒烟者的  
死亡率僅大於從不吸烟者。

佛德曼的研究結果與其他研究者  
的結果互相衝突，其他研究者說，  
某些其他因素而並非吸烟使吸烟者

者容易患心臟病。

他說，他曾對三五、九十七名男女的  
分析，這些人自一九六四年以來曾在三藩市及居留的凱撒  
保險公司進行健康檢查。

他說，此項研究報告於二月間在美國心臟協會會議中發  
表，但是統計數字並未公開，直到該協會對此項報告加以  
檢討之後。

【聯合新聞網】據凱撒保險公司專  
家的研究報告中說，戒烟的人的心  
臟病死亡率較戒菸者的臟病死亡  
率大二點二倍。這項研究的佛德曼博  
士說，實際上，戒烟的人的心  
臟病死亡率減少一半以上。

此項研究報告是根據對七、六五  
個長期吸烟者在經過長期吸烟後已戒  
烟，較從未吸烟者的心臟病死亡  
率低了百分之十二左右。

佛德曼對於這一事實的理由不能  
加以說明，但是他提到，一切原因  
（不只心臟病，並包括癌症）的死  
亡率在長期吸烟者當中最高，而在  
從不吸烟者當中最低，而戒烟者的  
死亡率僅大於從不吸烟者。

佛德曼的研究結果與其他研究者  
的結果互相衝突，其他研究者說，  
某些其他因素而並非吸烟使吸烟者

者容易患心臟病。

他說，他曾對三五、九十七名男女的  
分析，這些人自一九六四年以來曾在三藩市及居留的凱撒  
保險公司進行健康檢查。

他說，此項研究報告於二月間在美國心臟協會會議中發  
表，但是統計數字並未公開，直到該協會對此項報告加以  
檢討之後。

【聯合新聞網】據凱撒保險公司專  
家的研究報告中說，戒烟的人的心  
臟病死亡率較戒菸者的臟病死亡  
率大二點二倍。這項研究的佛德曼博  
士說，實際上，戒烟的人的心  
臟病死亡率減少一半以上。

此項研究報告是根據對七、六五  
個長期吸烟者在經過長期吸烟後已戒  
烟，較從未吸烟者的心臟病死亡  
率低了百分之十二左右。

佛德曼對於這一事實的理由不能  
加以說明，但是他提到，一切原因  
（不只心臟病，並包括癌症）的死  
亡率在長期吸烟者當中最高，而在  
從不吸烟者當中最低，而戒烟者的  
死亡率僅大於從不吸烟者。

佛德曼的研究結果與其他研究者  
的結果互相衝突，其他研究者說，  
某些其他因素而並非吸烟使吸烟者

者容易患心臟病。

他說，他曾對三五、九十七名男女的  
分析，這些人自一九六四年以來曾在三藩市及居留的凱撒  
保險公司進行健康檢查。

他說，此項研究報告於二月間在美國心臟協會會議中發  
表，但是統計數字並未公開，直到該協會對此項報告加以  
檢討之後。

【聯合新聞網】據凱撒保險公司專  
家的研究報告中說，戒烟的人的心  
臟病死亡率較戒菸者的臟病死亡  
率大二點二倍。這項研究的佛德曼博  
士說，實際上，戒烟的人的心  
臟病死亡率減少一半以上。

此項研究報告是根據對七、六五  
個長期吸烟者在經過長期吸烟後已戒  
烟，較從未吸烟者的心臟病死亡  
率低了百分之十二左右。

佛德曼對於這一事實的理由不能  
加以說明，但是他提到，一切原因  
（不只心臟病，並包括癌症）的死  
亡率在長期吸烟者當中最高，而在  
從不吸烟者當中最低，而戒烟者的  
死亡率僅大於從不吸烟者。

佛德曼的研究結果與其他研究者  
的結果互相衝突，其他研究者說，  
某些其他因素而並非吸烟使吸烟者

者容易患心臟病。

他說，他曾對三五、九十七名男女的  
分析，這些人自一九六四年以來曾在三藩市及居留的凱撒  
保險公司進行健康檢查。

他說，此項研究報告於二月間在美國心臟協會會議中發  
表，但是統計數字並未公開，直到該協會對此項報告加以  
檢討之後。

【聯合新聞網】據凱撒保險公司專  
家的研究報告中說，戒烟的人的心  
臟病死亡率較戒菸者的臟病死亡  
率大二點二倍。這項研究的佛德曼博  
士說，實際上，戒烟的人的心  
臟病死亡率減少一半以上。

此項研究報告是根據對七、六五  
個長期吸烟者在經過長期吸烟後已戒  
烟，較從未吸烟者的心臟病死亡  
率低了百分之十二左右。

佛德曼對於這一事實的理由不能  
加以說明，但是他提到，一切原因  
（不只心臟病，並包括癌症）的死  
亡率在長期吸烟者當中最高，而在  
從不吸烟者當中最低，而戒烟者的  
死亡率僅大於從不吸烟者。

佛德曼的研究結果與其他研究者  
的結果互相衝突，其他研究者說，  
某些其他因素而並非吸烟使吸烟者