

當與此有別是也、胃病者其暈常兼食滯之狀、而患之者亦爲中年之人、至其無耳鳴及聞系受累二事、則其區別明矣、此外如心門病、岨硬病之頭暈、亦皆不可不辨。

耳病之暈、最當與痼暈有別、惟痼者其有耳鳴實甚少、而其暈亦輕也、腦膈病如癥者、亦或暈而暫不省人事、且亦嘔吐、如能審其病狀、則區別之事無難也。因眼曲光線之功受累而視不中者、亦有暈狀。病之結局、靡有一定、有痊癒者、有致聾而暈則愈久而作愈頻者、重者或常暈而不能起牀。

治法 服鈹、氫鹽、每劑二十厘、每日三次、亦或有益、嘗患瘰者、可服鈹、氫鹽、有用樊強攀者、有用桂林大劑者、岨之壓大而硬者、釐三氫弱攀可用之、初用最少之劑、而漸增之、視不中者、當療其曲光線之病。

舌喉系

第九顱系之絲有三類焉、即司動司覺及司嘗三者是也、其司動支所司之肌、即錐喉肌及喉中嚥肌、其司覺之絲則至於喉之上段、司嘗之絲則

1. Errors in refraction.

2. Pot. Bromid. 1.3

3. Ametropia.