

LE

Naturaliste Canadien

Vol. VIII. CapRouge, Q., MAI, 1876. No. 5.

Rédacteur : M. l'Abbé PROVANCHER.

FAUNE CANADIENNE.

—

LES POISSONS.

—

(Continué de la page 105).

—

III. LES SUBBRANCHIENS.

Ventrales au dessous ou en avant des pectorales.

Cet ordre, dont le plus grand nombre des sujets sont confinés aux eaux salées, se divise en trois familles, qu'on peut ainsi séparer les unes des autres.

Corps comprimé latéralement, un œil de chaque côté de la tête ;

Deux ou 3 dorsales distinctes. I. GADIDES.

Première dorsale engagée sous la peau. III. CYCLOPTÉRIDES.

Corps aplati ; les 2 yeux du même côté de la tête. II. PLANIDES.

Fam. I. GADIDES. *Gadidæ.*

Corps allongé, faiblement comprimé, couvert d'écailles molles et très petites ; tête sans écailles. Toutes les nageoires molles. Les mâchoires et le devant du vomer garnis de dents pointues, irrégulières, assez petites, en plusieurs rangs formant une espèce de râpe. Six rangs de branchies. Ventrales distantes, à la gorge. Deux ou 3 nageoires dorsales, la caudale passablement longue. Vessie natatoire à parois fortes et souvent dentelées.