

l'état général. Cure d'altitude durant 3 mois avec amélioration minime et gain de poids de 5 kilogr., lorsqu'en avril 1904, la cure créosotée est essayée pour avoir raison de cette tuberculose, heureusement apyrétique, mais à forme caverneuse tenace. Les "Capsules Dartois" sont employées à la dose de 4, puis 8 par jour aux repas. Malgré une rechute momentanée, pulmonaire et laryngée, survenue au cours du traitement, *les lésions se sèchent et diminuent peu à peu.* Le taux bacillaire descend de 25 à 15% et le malade reprend ses occupations, qu'il continue maintenant depuis 2 ans  $\frac{1}{2}$  sans rechutes et tout en continuant par intervalle la cure créosotée Dartois (avril 1906).

Obs. III. — *Mme A. B., Londres, 28 ans.* — Tuberculose apyrétique caverneuse du tiers supérieur du poumon droit avec infiltration presque jusqu'à la base de ce poumon. Infiltration fibro-caséuse du tiers supérieur du poumon gauche. L'affection dure depuis 2 ans et *avait été traitée inutilement* par l'huile de foie de morue, le gaïacol, la suralimentation, lorsqu'en janvier 1906, la cure créosotée est essayée sous forme de "Capsules Dartois" à la dose de 10 par jour aux repas. *En 8 semaines de ce traitement,* le poids augmente de 7 kilogr., les symptômes caverneux font place à des signes d'infiltration sèche, l'expectoration diminue des deux tiers et le taux bacillaire descend de 80 à 30  $\frac{1}{2}$ , les bacilles de Koch prenant la forme allongée et granuleuse qui indique chez eux une grande diminution de la vitalité et de la virulence. Cette tuberculose mise ainsi *sur la voie de la guérison* grâce au traitement créosoté, continue à s'améliorer régulièrement, la "Cure Dartois" étant poursuivie sous la forme de 8 capsules par jour, avec interruption un jour par semaine et une semaine sur quatre (avril 1906).

Dr STEPHANI,  
*Directeur du Sanatorium de Montana.*

---