

2 à 2½ pieds; feuilles d'un pied de longueur. L'analyse montre que c'est une herbe riche, à forte teneur en matière sèche et en albuminoïdes et contenant peu de fibre. A la même période de végétation, de composition très semblable à celle de *Poa pratensis*.

51, 52.—*POA SEROTINA*, Ehrh. (Paturin tardif; Fowl Meadow Grass).

Graminée indigène, vivace; fine, flexible, produisant une abondance de tiges grêles qui restent longtemps vertes après la maturation de la graine. Depuis 150 ans on cultive en petite quantité cette excellente graminée. Elle vient bien dans les terrains bas, et à la fin d'août donne un regain presque aussi abondant que la première coupe au commencement de juillet. Le foin est flexible, très nutritif et est bien aimé par le bétail. Floraison, 1er au 10 juillet. Hauteur, 18 pouces à 2 pieds.

53.—*SETARIA GLAUCA*, Beauv.

(Sétaire glauque, Vulpin jaune; Yellow Fox-tail).

Graminée annuelle, originellement introduite, mais maintenant commune dans toute l'Amérique du Nord. Sans aucune valeur agricole, quoiqu'on la trouve à l'occasion luxuriante dans les chaumes et les lieux perdus. Floraison, août. Hauteur, 1 à 2 pieds. On ne peut la considérer comme une herbe riche, quoique, quand elle est jeune, elle soit assez nutritive.

54.—*SETARIA ITALICA*, Kunth

(Millet des oiseaux; Hungarian Millet, Bengal grass).

Graminée introduite, annuelle; utile pour récolte dérobée, en raison de sa végétation rapide et de la date tardive à laquelle on peut la semer. Réussit bien dans terrain léger sec, et produit un foin abondant, qu'il faut couper tôt. Hauteur, 2 à 2½ pieds. N'est pas des meilleures, se détériore rapidement à mesure qu'elle mûrit, et une fois mûre n'a pratiquement aucune valeur, sauf pour ses graines. La jeune plante, toutefois, fournit un excellent fourrage.

55.—*SPOROBOLUS HETEROLEPIS*, Gray

(Jette-graine fétide; Fetid Drop-seed grass).

Graminée des plaines, indigène, vivace; produisant une quantité de longues feuilles fines. Peut végéter dans le sable presque pur ou dans l'argile forte. Quand elle est en fleur, elle émet une odeur forte particulière désagréable, que l'on peut sentir jusqu'à une longue distance des plantes. Les animaux mangent volontiers les feuilles, mais il rejettent les tiges à fleurs. Floraison, 15 au 25 juillet. Hauteur, 2 pieds. Son taux élevé de matière sèche et sa composition lui donnent une place parmi les graminées de bonne qualité.