

de même couleur que le tronc en dessus comme en dessous, de forme un peu grêle, pointue.

Tête aplatie, à cou plus étroit. Narines latérales, situées près de l'extrémité du museau. Lèvres blanchâtres, yeux grands, iris grisâtre, pupille foncée.

Ecailles non carénées.

Ce joli petit serpent se trouve ordinairement sous les pierres ou dans des cavités au pied des arbres. Il se nourrit d'insectes qu'il chasse d'ordinaire à l'aurore ou vers le déclin du jour. Le spécimen de Mr. Huard ne laisse voir aucune trace de points noirs sur la ligne médiane des plaques ventrales.

Fam. des SYNCRANTERIENS. (1)

Serpents dont toutes les dents sont lisses, distribuées sur une même ligne, mais avec les dernières plus longues, sans intervalle libre au devant d'elles.

Sur les cinq serpents que nous possédons, deux appartiennent à cette famille ; tous deux se rangent dans le genre qui suit :

Gen. TROPIDONOTE. *Tropidonotus*, Kuhl. (2)

Mâchoires longues, les dents de la supérieure formant une série longitudinale continue, quoique les dernières, ou les postérieures, soient généralement plus fortes et plus longues à peu près de la moitié, et jamais cannelées. Ecailles du dos, et généralement celles des flancs, portant une ligne saillante ou une sorte de carène. Queue médiocre pour la longueur. Corps allongé, cylindrique, insensiblement plus gros vers la région moyenne.

1. Tropidonote sirtale. *Tropidonotus sirtalis*, Holbrook ; *Cobuber sirtalis*, Linn. ; *Tropid. bipunctatus* Schlegel.—Vul. *La Couleuvre*

(1) De *syn*, avec et *cranteras*, dents postérieures.

(2) De *tropis*, *tropidos*, carène et *notos*, dos.