

queue  $3\frac{3}{4}$  pouces. Plumes du dessus d'un brun foncé, marginées de blanc brunâtre avec une tache de brun rougeâtre à l'extrémité. Parties exposées des ailes et de la queue avec barres transversales de brun foncé. Dessous jaune avec un croissant noir sur la poitrine ; les côtés d'un brun roussâtre pâle avec stries noirâtres.

P. RR. Cette Alouette qui est assez commune dans Ontario au printemps, n'a encore jamais été vue à Québec, pensons-nous. C'est un bel oiseau, dont le chant est aussi fort agréable. Nous nous sommes plu mainte et mainte fois à l'examiner, tout en l'écoutant, sur les haies, aux Illinois, où elle se montre très abondante. Elle niche sur le sol et pond de 4 à 5 œufs blancs tachetés de points et de taches roussâtres.

(A continuer).

---

## PETITE FAUNE ENTOMOLOGIQUE

DU

CANADA.

—  
(Continuée de la page 171).  
—

### Fam. I. CICINDELIDES.

Tête large ; mandibules longues et à dents aiguës.

Antennes filiformes, insérées sur le front, au dessus de la base des mandibules.

Mâchoires portant 2 lobes, l'extérieur bi-articulé et l'intérieur avec une dent articulée à son extrémité, dans les espèces de notre faune.

Menton profondément échancré ; avec une dent aiguë au milieu ; languette petite, cachée ; base des palpes labiaux libre.

Prothorax avec épimères et épisternes distincts.

Métasternum en pointe en arrière, atteignant l'abdomen.