

tion. En outre, il peut être utile de l'associer à certains remèdes populaires comme l'ail. A cet égard, la formule donnée par le *Journal de médecine interne*, et due à Pellissier, présente un intérêt pratique :

1° Faire prendre la veille au coucher, et le lendemain matin, à jeun, la mixture suivante :

Ail coupé en menus morceaux	1 gousse
Lait.....	1 petite tasse.

Faire cuire à petit feu pendant dix minutes, passer sur un linge et sucrer à volonté (la cuisson fait perdre à l'ail ses propriétés âcres et rend la préparation très acceptable). Cette cure a pour but de rendre les parasites plus vulnérables en modifiant leurs conditions d'existence et d'introduire dans l'estomac une huile essentielle qui en excitera la sécrétion acide et diminuera sa capacité d'absorption envers le médicament.

La santonine sera donnée quelques minutes après le lait à l'ail et formulée :

Santonine. Dose suivant

l'âge (généralement).....	0 gr. 01 centigr.
par année jusqu'à.....	0 gr. 30 centigr.
Huile d'amandes.....	5 grammes.

Faire dissoudre et ajouter :

Sirap de gomme.....	} ââ 20 grammes.
Eau de fleurs d'oranger	
F. S. A. looch : agitez.	

A prendre en trois fois à cinq minutes d'intervalle. Deux heures après, purgation par le calomel.

La santonine ainsi dissoute dans l'huile traversera l'estomac sans être touchée par les sucs digestifs ; la dose ingérée tout entière atteindra le parasite, conservant pour lui seul toute son activité toxique.