

ennemi fort redoutable dans la larve d'un longicorne, le *Clytus robinia*, Forster, qui en rongéant le tronc de toute part, fait souvent périr entièrement des plantations de la plus belle venue et des plus étendues. Comme nous n'avons pas encore rencontré cette espèce de longicorne en Canada, bien que ses congénères soient assez nombreuses, il pourrait se faire que l'arbre ici n'aurait pas à souffrir de ses attaques. Ce qui nous confirme d'avantage dans cet espoir, c'est que nous avons vu à Montréal plusieurs Féviers adultes bien sains et fort vigoureux.

Toutefois que les expérimentateurs de Bécancour et de St. Grégoire poursuivent leurs essais et rendent consciencieusement compte au public de leurs résultats quels qu'ils soient, ce sera une nouvelle lumière pour résoudre définitivement la question.

## LA CHENILLE DU GADELLIER.

*Nematus ventricosus*, Klug.



Fig. 6.

Si nos voisins de l'Union peuvent nous reprocher avec

Fig. 6.—Feuilles de groseillier attaquées par les larves de la *Nematus ventricosus*, Klug; *a, a, a*, montrent des larves à différents états de croissance; *b*, est le profil d'une section de larve pour montrer la position des points noirs qu'elle porte avec les poils qui los hérissent.