

Sür unsere Farmer



Vorgänge und Hilfeleistung bei der regelrechten Geburt des Kindes.

Die Geburt wird eingeleitet durch immer stärker werdende, krampfartige und schmerzhafte Zusammenziehungen des Traglades, die sogenannten Wehen. Diese äußern sich bei den Tieren in Unruhe, Hin- und Herbrettern, wiederholtem Entleeren von Kot und Harn. Mit dem Eintritt der eigentlichen Geburt legen sich die Tiere meist auf den rechten Hinterbein nieder, da sie in dieser Lage am leichtesten gebären. Es ist jedoch alles zu vermeiden, was sie föhren, erschrecken und zum Wiederaufstehen veranlassen könnte.

Die Wehen geschehen nun unter Mitwirkung der Bauchdecken (Presswehen) und treten immer heftiger und in kürzeren Pausen auf. Sie treiben einen Teil der Fruchtstüben mit dem Fruchtwasser in die Scheide, wo die Eihäute als eine bläuliche, glänzende Blase (Wasserblase) sichtbar werden. Diese sich mehr und mehr ausdehnende und vordringende Blase ist das natürliche und beste Mittel zur Öff-

nung und Beugung der Geburtswege. Ihre vorzeitige und künstliche Zerkleinerung und Entleerung stört die natürliche Entwicklung der Geburt und gibt Veranlassung zu unangenehmen Ausgängen derselben.

Unmittelbar nach dem Verlassen der Wasserblase erfolgt eine Veränderung der Lage des Jungen, so daß es mit dem auf den Vorderbeinen ruhenden Kopf voraus in die Geburtswege eintritt. Stört man durch vorzeitiges Eingreifen und Öffnen der Blase diese für die Austreibung günstige Lagerung, so ergeben sich Schwierigkeiten, die die selbständige Geburt unmöglich machen und unter Umständen auch den Erfolg schmerzhafter Hilfe in Frage stellen können. Bei schwachen, beziehungsweise durch einseitige Fütterung und Ernährung geschwächten Kühen kann der Geburtsvorgang sich oft ungewöhnlich lange hinziehen und künstliche Hilfe notwendig machen. Doch lasse man sich auch in diesen Fällen nie verleiten, die Wasserblase zu öffnen, da diese regelmäßig von selbst berstet, wenn sie durch die Schamspalte tritt und die Geburtswege genügend erweitert hat.

Auch da, wo die Frucht mit ihren Gliedern aus irgend einem Grunde nicht aus dem Traglad herauszutreten kann und tierärztliche Hilfe notwen-

dig wird, ist das Öffnen der Blase verwerflich, weil die unersetzten Eihäuten den besten Schutz gegen Beschädigungen der Geburtswege durch allzu stürmische Wehen zu bieten vermögen. Jeht bis fünfzehn Minuten unter Umständen auch einige Stunden — nach dem Verlassen der Wasserblase folgt eine zweite, weisbalgige, dünnere Blase, die sogenannte Fußblase, durch deren Wand die Füße und das Maul des Jungen durchschießen. Auch diese ermöglicht und fördert durch die Erweiterung der Geburtswege den regelrechten Verlauf der Geburt und berstet danach in der Regel von selbst. Ihre künstliche Eröffnung sollte erst vorgenommen werden, wenn die Vorderbeine bis zum Schultergelenk (Arme) und der Kopf bis zu den Augen aus dem Becken hervorgetreten sind. Die Eröffnung wird dann aber auch nötig, weil sonst den von der Blase eingeschlossenen Jungen Erstickung droht.

Eine künstliche Nimitzung bei einer regelrecht verlaufenden Geburt ist für gewöhnlich nicht nötig. Nur dann, wenn die regelrecht liegende Frucht, nachdem sie mit dem Kopf bis zu den Augen und mit den Vorderbeinen bis zu den Knien aus der Schamspalte hervorgetreten, nicht rasch genug von selbst entwidelt wird; ferner wenn die Frucht mit den Hinterbeinen gerichtet, die Sohlen der Klauen nach oben, bis zu den Sprunggelenken, geboren ist und in dieser Lage längere Zeit stehen bleibt, ist eine Unterstützung ratsam. In diesen Fällen zieht man jeweils gleichzeitig mit den am Zusammenziehen der Bauchwand sichtbaren Presswehen, und zwar recht gleichmäßig, nicht ruckweise am Jungen.

Beim Herausziehen der ersten Hälfte derselben ist etwas nach hinten und unten zu ziehen, nachdem mehr nach hinten und oben. Die Fruchtstüben dürfen dabei nicht mit Gewalt und herausgezogen werden, weil sonst gefährliche Verletzungen und Verfall des Traglades entstehen können. Mit starker Zugkraft nötig, so werden die Füße über den Beckenrand mit der Schlinge eines ausgefoderten Strickes mit reinen Händen so umschmirt und verbunden, daß an beiden Füßen gleichzeitig gezogen werden kann. Dazu sollte eine härtere Straß als ein fruchtiger Mann zu leisten vermag, nicht angewendet werden. Da das Becken genügend Zeit zur allmählichen Erweiterung haben muß, ist

vorzeitiges Anfeilen und Herausziehen der Frucht, etwa sobald die Füße sichtbar oder gar erst sichtbar sind, schädlich und gibt außer zu Verletzungen der Geburtswege und Beckenbrüchen zu dem so schwer zu beseitigenden Juraufbleiben des Kopfes Veranlassung.

Beim Herausziehen ist zu berücksichtigen, daß der Durchtritt der Frucht und nachher des Beckens knochern ist und darum einen kurzen Aufenthalt veranlaßt. Wenn der Kopf des Jungen durch die Scham sehr stark umschmirt wird, so können Darmrisse dadurch verursacht werden, daß man die Schamlippen mit den gekrümmten Fingern umgreift und über den dünnen Teil des Schädels zurückzieht. Jeweils kommt das Junge von den Fruchtstüben los, schließt zur Welt und kann erwidern, wenn die Hüften nicht bald von ihm selbst oder künstlich gelöst werden.

Die Mutter und Junge verbinden die Nabelschnur recht weit schon während der Geburt von selbst, aber wenn das Muttertier nach der Geburt rasch aufsteht, wenn dies nicht der Fall ist oder der Stumpf zu lang bleibt, soll man die Nabelschnur eine Handbreit unter dem Nabel mit einem abgekanteten weissen Bande umbinden und weiter unten mit reinem Pfeffer oder Scherz abbinden. Der Stumpf soll zur Verhütung von Nabelkrankheiten, Räube und anderen Anfechtungen mit Teer (Vine Tar) bestrichen werden.

Einige Zeit nach der Geburt treten die sogenannten Nachwehen ein, durch welche die zurückgebliebenen Fruchtstüben (Nachgeburt) gelöst und entleert werden. Diese Ablösung erfolgt in 1 bis 10 Stunden nach der Geburt. Die Nabelschnur des Voranges empfindet sich um Verletzungen, die durch Abknäueln, Draufsetzen, Anreiben entstehen können, zu vermeiden; die alsbaldige Entfernung der Nachgeburt aus der Nähe der Mutz ist außerdem auch noch mal anfruchtig, wenn sie in ihrem Reich ist, was dann Verwundungsbeschwerden, Woll und selbst den Tod bedingen kann. Durch Ziehen, Anbringen von Gewichten und dergleichen an der herabhängenden Nachgeburt soll deren Abgang nicht behindert oder zu beschleunigen geleistet werden; geht sie nicht von selbst ab, so soll sie von sachverständiger Hand gelöst und abgenommen werden.

Der während einiger Tage bestehende, anfangs mit Blut vermischte, harte helle Ausfluss, vermindert nach spätestens acht Tagen; längerer Bestehen weist auf einen krankhaften Zustand hin.

Zur Verhütung von bestimmten Nachdrängen und dadurch bedingten Vorfällen der Gebärmutter läßt man die Mutz an beiden nach der Geburt aufstehen oder setzt für erholte Ruhe der Mutz ein Drittel Quart täglich pro Ferne.

gang der Nachgeburt wird die von den Abgängen verunreinigte Streue entfernt, die Scham und Umgebung mit einer desinfizierenden Flüssigkeit (1 Eßlöffel Jodol in 2 Quart Wasser) gewaschen und gereinigt. Entzündungen der durch den Geburtsakt erbiten Mutz deutet man durch Eindringen, hohe, trockene Streue und besonders durch Schup gegen Zugluft vor. Zur Verhütung und Kräftigung reicht man ihr Meilen- oder Weizenstränke. Zu übrigen gibt man dem erschöpften Tier nur wenig und leicht verdauliches Futter, unter Vermeidung von kaltem Trinken. Erst allmählich geht man zur gewöhnlichen Fütterung über.

Das nasse Junge wird der Mutter zum Trostenden gegeben. Amet es auf diesen Dautreiz bin noch nicht genügend, so entfernt man den Schleim aus Maul und Nase, befeuchtet es mit kaltem Wasser und reibt es energisch mit Strohwolle oder einer steifen Bürste ab.

Winke für Anfänger in der Geflügelzucht

1. Fange deine Zucht mit kleinem Stämme an. Erst auf Grund gesammelter Erfahrungen erweiterst du dann und nach deine Anlage.

2. Kaufe kein Geflügel aus allen Ecken und Enden zusammen. Dadurch erhältst du nur minderwertigen Nachwuchs und riskierst Einschleppung aller möglichen Krankheiten.

3. Alle Einrichtungen treffen möglichst einfach, aber gut und zweckentsprechend. Es genügt vollauf einfache, aber reine, gesunde und luftige Räume.

4. Entnimme die Eier zweimal täglich den Nestern. Ein bräunliches Ei, auf dem die Hühner mehrere Stunden gelehnt hat, verliert nicht nur an Haltbarkeit, sondern auch an Nährwert. Sorge auch dafür, daß die Hühner rein sind, dann sind die Eier es auch.

5. Halte bestimmte Fütterzeiten regelmäßig inne und gebraue nur gute, vollwertige Futtermittel. Hier gibt lieber etwas mehr aus, als daß du billigen, wertlosen Kram kaufst. Verabreibe nebenbei im Sommer viel Getreide, im Winter als Ersatz hohle und Anzuchtfrüchte. Ein ganz hervorragendes Futtermittel ist im Winter gefeinter Hafer oder gefeinter Gerste.

6. Neben zweckmäßigem Futter bedarf das Geflügel ausreichend frisches Trinkwasser, das namentlich im Sommer täglich mehrmals erneuert werden muß und stets an schattigen Ort aufzustellen ist. Hühner gebrauchen mehr Wasser, als gemeinlich angenommen wird, man rechnet ungefähr ein Drittel Quart täglich pro Ferne.

7. Außer dem eigentlichen Futter müssen den Tieren stets nach folgende Stoffe zur freien Aufnahme zur Verfügung gestellt werden: Weiz (Schärf-

Typical Cases From the Hundreds of Thousands Relieved by BUCKLEY'S BRONCHITIS MIXTURE

You, too, are guaranteed this relief

Keeps Him Alive Other Remedies Failed

"My son who has been over years has been using your Bronchitis Mixture since coming home with a cold on his chest and tubes. He also has a cough. He could not live without Buckley's." Mrs. Ella Robinson, Box 422, Rodney, Ont.

"I have tried all sorts of cough remedies but have never tried anything before which has given so much relief as Buckley's Bronchitis Mixture." J. S. 613 Maryland St., Winnipeg, Man.

Sold by all druggists for Coughs, Colds, Laryngitis, Bronchitis

W. K. BUCKLEY, LIMITED
142 MUTUAL ST. TORONTO

Kuh - Häute - Ochsen

haben wenig Wert im rohen Zustande. Wir gerben

Dieselben zu Gelehrter, welches viel stärker und dauerhafter als das gewöhnliche Leder ist.

Diese sowie Fellebühne gerben wir auch mit der Haaren daran, zu den besten, wärmten Decken.

Kleinere Häute verarbeiten wir für Nahrungsmittel (Lacelather). Preisliste und Shippingtags auf Verlangen.

Alle Korrespondenz sofort beantwortet.

EDMONTON TANNERY
L. Gattenmeyer
9172-1104 Ave., Edmonton. — 22. St. n. Ave. 6, Saskatoon.

sanigte Steinden), Wuschelfalt oder Pausdruck und zerfallene Holzbohle. Wenn auch keine eigentlichen Nahrungsmittel, so sind diese Stoffe doch zur besseren Verdauung und Gesundheitshaltung notwendig.

8. Benutze zur Unterscheidung des Alters Fähringe. Ohne Alterskontrolle ist eine nutzbringende Zucht nicht möglich.

9. Zur Brut nimm nur normal gefaltete Eier deiner besten Tiere. Darf du die Gewähr, daß auch die Nachzucht etwas leisten wird.

10. Bei der ersten Aufzucht beachte, daß die geschlüpften Küken in den ersten 48 Stunden nach dem Ausbruch bedürfen, so, daß solches ihnen entschieden schädlich ist. Für die Aufzucht halten wir nach unleren Erfahrungen die Trockenfütterung für am besten, wenigstens für die ersten Lebenswochen. Das Futter ist anfangs alle zwei Stunden in kleinen Portionen zu reichen.

Hühner und Gartenarbeiten

Allmählich beginnt wieder die Arbeit im Obst- und Gemüsegarten. Da ist es sehr angebracht, den Hühnern

den Garten wieder freizugeben; Schaden können sie noch nicht anrichten, wohl aber dem Geflügelhalter von Nutzen sein, abgeben davon, daß ihnen diese gesunde Bewegung zum Vorteil ist. Der im Herbst umgegrabene Gartenboden ist durch Schnee- und Regenwasser ganz vollgeleert und tief gelodert, er fordert die Hühner geradezu zum Scharen auf und der groß geschollert liegen geliebene Boden wird bald wie gebarst aussehen. Alle Regenwürmer, Engerlinge, Larven und Schnecken werden begierig aufgenommen und es entgeht so leicht ihren schädlichen Wästen nicht. Auch im Obstkarten stützen die Tiere ihren Krallen, indem sie beim Wackern und Aufgraben der Baumstüben und Kronenträufen die Schablinge, die von den Bäumen herabfallen, abnehmen und sich in den Baumstüben zu vertiefen finden, reißlos vertilgen. Sogar beim Umgraben des Gartens im Frühjahr ist es erforderlich, die Hühner hinzulassen. Sie werden schnell vertraut werden und nicht vom Spaten des Grabenden weggehen. Diese animalische Nahrung ist den Tieren ein Bedürfnis, das sie zur fortwährenden Eierablage unbedingt benötigen.

Aspirin

Hüte Dich vor Nachahmungen



Sie nicht das echte Bayer-Produkt, das von Bersten seit 23 Jahren vertrieben und für Millionen als sicher sich erweisen gegen

Erfaltungen
Nachahmung
Neuritis
Lumbago
Schmerz, Schmerz

Von nehme nur „Bayer Tablets of Aspirin“. Jedes Paket enthält Gebrauchsanweisungen. Schachteln mit 12 Tabletten kosten nur wenige Cents. Druggisten verkaufen auch Flaschen mit 24 und 100 Tabletten.

Wenn der Name „Bayer“ nicht auf Schachtel und Tablette steht, erhalten

Kaufte der Grundzüge, der Sitten, des Charakters.“ Nicht.

Der große Weltbaumeister stirbt nicht; Jährlich Jahrhundert ist ein Quaderstein. Den er zu fröhren, schon gefügt, legt; Jndes Geschlechter steigen aufsteigend.

Nervensärker
Pastor König's
Bestes Mittel gegen Epilepsie (Hinfällende Krankheit) Nervenerregung, Schlaflosigkeit, etc.

Hunderte von Dankschreiben.
Preis per Flasche \$2.75 portofrei.

Nur echt zu haben bei:
Deutsche Apotheke
B. Woffig,
P.O. Box 124, Regina, Sask.

Unsere schlechte wirtschaftliche Lage

Der Westen ist in einer bösen wirtschaftlichen Lage. Und das ist kein Wunder. Der Farmer kann nicht vorwärts kommen. Er muß hohe Preise zahlen für alles was er kauft, denn alles was er braucht ist von organisierten Fabrikanten und Arbeitern hergestellt und wird ihm von organisierten Händlern verkauft. Und er muß mit dem niedrigsten Preise zufrieden sein, denn er ist nicht organisiert, seine Ware zu verkaufen. So muß er zu hoch bezahlen und bekommt zu wenig — und das erklärt seine schlechte wirtschaftliche Lage hinreichend.

Mit dem Farmer leidet jeder und alles geht mehr und mehr herunter. Und es gibt keine Rettung für die andern, wenn der Farmer nicht gerettet wird, denn er ist das Rückgrad des Landes.

Der Weizen-Pool ist gebildet, um das Rückgrad wieder gesund zu machen. Mitglieder des Pools sind sämtlich Farmer und Guch selbst.

Sask. Wheat Producers Ltd. Mitgliederzahl 6,020,500 Unterzeichnet bis heute 3,693,617.

Der große Jäger.

Von Christian Bouchholz.

— und plötzlich, hatte mich gesehen, stand der Köder vor mir ... kaum hatte ich Zeit, das Gewehr zu entfeuern, schon sprang der Löwe an. Ein Satz — ich werfe mich ihm rasch entgegen lang auf die Erde — er in hohem Bogen über mich hinweg — ich mich rasch umgedreht — er sich rasch umgedreht — peng! Da liegt er und streckt alle Niere von sich!

Wir — eine kleine Gesellschaft von Männern, die einigermassen in der Welt und einigen ihrer Bildnisse herumgekommen waren — hatten alle den Anseh eines verflochtenen Nadelns in den Rundwinkeln. Dieser gute Kerl, der wiederum Grund aus Ostafrika, schob denn doch zu viele Löwen und Elefanten. Man behandelte ihn als fomiische Figur, obwohl er immerhin ein tüchtiger Jäger gewesen sein soll.

Verdriß lenkte ab: „Nachdem ich dies Jahr meinen ersten Löwen geschossen habe, habe ich meine Koflenvorräte verdupelt.“ Es gibt einen strengen Winter.

Einer von uns, ein Nichtjäger, fragte: „Was soll das heißen? Was hat der Löwe mit den Koflen zu tun?“ Er wurde aufgeföhrt. Jeder Jäger wisse bereits zu Beginn der

MINARD'S
"KING OF PAIN"
LINIMENT


Här wehen Hals,
Brusterkältung,
Diphtheritis,
Serrantungen
und alle Familienkrankheiten

Versteht von der
Minard's Liniment
Co., Limited
Barnmouth, N. E.

roden? Meine Ansichten weichen von der normalen Ansicht der „höheren europäischen Kultur“ ab. Ich will nicht von den Reden sprechen. Ich liebe meine Nadelns; ich liebe unter ihnen, fast wie übergleichene. Wenn man sich ihnen anpaßt, sind sie die treuesten Helfer. Aber, so führt der alte Palmer fort, „von den Tieren zu reden —“

„Ich war wirklich einmal ein „großer Jäger“. Das Jagdleben war es, das mich den Eingeborenen nahe-

brachte. Wenn ich nun erzähle, daß ein Tag kam — es war gleich in meiner ersten Aritzeit — ein Tag, an dem mir plötzlich die Kurage ausging, zu scheitern, werden Sie es wahrheitslieblich verzeihen finden. Eines Nachts hatte ich mich an einen Fluß herangelehrt, auf eine Stelle, die, nach den Spuren zu urteilen, einzigen Fischorten, Elefanten nämlich, als Tränke diente. Der Ehrgeiz trieb mich damals, einen Elefanten zu erlegen. Stunden lag ich auf der Lauer, das Gewehr schuß-



Why Ford Predominates

Viele Gründe von vielen Gebrauchern


Wenn Sie die nächsten fünfzig Ford Besitzer fragen würden, warum sie die Ford Car vorziehen, so würden Sie eine große Anzahl verschiedener Antworten erhalten.

Einige würden sagen, „weil sie sich einfach garnicht ansprechen“ andere würden antworten „weil sie so wenig kosten“, manche würden entgegen „weil ich allenthalben Bedienung bekomme“ und gerade so viele würden sagen „weil es die einzige Car ist, die ich mir leisten kann.“

Alle würden Ihnen sagen, „weil sie in jedem Wetter, auf jede Art Weg zu brauchen sind.“ Eine Frau würde antworten „weil ich sie so leicht fahren kann.“ Von solchen, die mehr Cars brauchen, würde man vernehmen, „Ich kann zwei oder drei Ford Traks kaufen für den Preis, den ein großer Trak kostet.“

Wimmern Sie fragen, Sie würden diese Hauptgründe, warum Ford die andere übertrifft, vernehmen — bedenken Sie — Jahr auf Jahr werden ebensoviele Fords verkauft als alle andere Cars zusammen.

Man gehe zum berechtigten Ford Händler.



CARS - TRUCKS - TRACTORS