

Durant cette *première période*, qui dure une dizaine de jours, les fragments sont mobiles dans le sang et la lymphe épanchée.

La *deuxième période* est constituée par l'organisation *fibro-cartilagineuse* de cette lymphe plastique.

La *troisième période* est caractérisée par l'envahissement des *ostéoplastes*.

L'ossification est achevée entre la huitième et la dixième semaine et le blessé peut commencer à se servir de son membre.

La fracture est alors assez solidement unie. Le cal finit par ressembler au vieil os en dureté et en structure vers le *sixième* ou *huitième* mois.

L'ossification du *cal provisoire* est alors parfaite.

La différence entre l'union d'une fracture *simple* et d'une fracture compliquée de plaie est la même que la différence qu'il y a entre la guérison d'une plaie sous cutanée et celle d'une plaie ouverte—c'est-à-dire que la fracture simple guérit rapidement je dirais par première intention, tandis que la fracture composée guérit par suppuration.

Dans le cas actuel, la fracture était des plus simple avec conservation du périoste, d'après le témoignage même du médecin appelé comme arbitre.

Une chose étonnante, c'est que les médecins de la défenderesse et le médecin appelé comme arbitre posent les mêmes prémisses et en arrivent ensuite à une conclusion si différente. La logique a dû faire défaut chez quelqu'un. On admet que les dommages doivent être calculés d'après une *simple fracture* de la clavicule, et on arrive à la conclusion que le blessé sera plus ou moins empêché de travailler pendant *trois ans*.

Voici le pronostic des différents auteurs sur la fracture simple de la clavicule.

*Nélaton*.—"L'union de la clavicule avec difformité ne gêne en aucune manière le bon fonctionnement du membre."

*Gosselin*.—"Les cals difformes ne gênent en aucune façon les fonctions du membre, mais c'est un désagrément pour les femmes jeunes qui aiment à se montrer les épaules nues."

*Erichsen*.—"La clavicule est plus souvent fracturée qu'aucun autre os du corps humain."

"La clavicule étant un os spongieux et très vasculaire l'union en a lieu rapidement. On a constaté l'union après 27 jours."

"Un homme peut après la guérison lever un poids aussi lourd avec le bras lésé qu'avec le bras sain."

*Ashurst* dit: "quant à la vie du patient et à l'utilité de son membre, le pronostic de la fracture de la clavicule est très favorable, mais la guérison sans difformité est très rare quand la fracture est au milieu de l'os."