

**Extrait de la Technique d'emploi du Radium et des Boues radioactives actinifères.** — (Librairie du Radium et de la Radioactivité), 4 rue Tronchet, Paris.

**Action des Boues radioactives actinifères sur les tissus adipeux.** — (Notamment sur la paroi abdominale).

“ La boue radioactive actinifères agit sur les tissus adipeux en diminuant le dépôt graisseux et en assouplissant les tissus cutanés.

“ *Technique.* — Applications de boue réchauffée à 40° au bain-marie et étendue sur une mousseline très légère maintenue sur la paroi abdominale pendant toute la nuit. (10 à 15 séances).

“ En cas d'irritation des téguments, arrêter un jour ou deux.

“ Si l'action d'un premier traitement était insuffisante, faire une seconde série d'applications 15 jours après.

“ Il est parfois bon de renforcer l'action de ces applications par des bains généraux de boues avec frictions à l'eau de Cologne et gant de crin.”

Prix de la brochure, franco... ..Fr : 1.

#### ENTERITE SANS LESION INTESTINALE.

Les pathologistes rapportent plusieurs cas de fièvre typhoïde sans lésion intestinale, il est alors important d'éliminer du traitement les médicaments que la lésion intestinale seule peut justifier.

Le patient doit avoir une chambre, aseptique, bien ventilée, éclairée et gaie ; il faut aussi le pouvoir d'eau assez fréquemment sans attendre qu'il en réclame, surtout si le coma persiste.

Le traitement est symptomatique, et l'infection organique du bacille typhoïque qui se généralise dans l'économie, produit bientôt l'émaciation par mauvaise nutrition, et il est nécessaire d'y remédier par un aliment léger et facilement digéré qui améliorera la nutrition. La BOVININE est alors un aliment idéal.

Au début, les antiseptiques intestinaux sont indiqués plus ou moins pendant le cours de la maladie ; mais il faut surtout préconiser les bains d'éponge pour réduire la température, soutenir la vitalité et nutrition autant que possible par une alimentation convenable.