

- Doigts réunis à la base par une membrane ;
 Tarses avec écailles transversales en avant et en arrière ;
 Bec droit ou relevé ;
 Rainure de la mandibule supérieure s'étendant de la base à la moitié de la longueur ;
 Jambes longues..... 1 GAMBETTA.
 Jambes courtes..... 2 RHYACOPHILUS.
 Rainure de la mandibule supérieure se prolongeant jusqu'aux trois quarts de la longueur ;
 Ouverture de la bouche dépassant à peine la base du bec..... 3 TRINGOIDES.
 Ouverture de la bouche se prolongeant presque jusqu'aux yeux..... 4 ACTITURUS.
 Bec épaissi et relevé à l'extrémité..... 5 LIMOSA.
 Tarses avec écailles transversales en avant seulement.. 6 NUMENIUS.
 Doigts fendus jusqu'à la base ;
 Front couvert de plumes ;
 Bec grêle. Doigt postérieur d'environ le tiers de la longueur du tarse 7 RALLUS.
 Bec fort. Doigt postérieur de la moitié au moins de la longueur du tarse..... 8 PORZANA.
 Front nu, avec plaque cornée 9 FULICA.

1. Gen. CHEVALIER. *Gambetta*, Kaup.

Bec droit, la mandibule supérieure un peu relevée à l'extrémité, les rainures ne s'étendant pas jusqu'au milieu. Membrane retenant le doigt extérieur jusqu'à la première jointure ; entre les autres doigts la membrane est très petite. Jambes longues, jaunes.

Le Chevalier aboyeur. *Gambetta melanoleuca*, Bon. *Scolopax Gmel. Totanus melanoleucus*, Vieil. *Scolopax vociferus*, Wils.—Angl. *Tell-Tale* ; *Stone Snipe*.—Longueur 14 pouces ; ailes 7½ ; queue 3½ ; bec 2¼ ; tarses 2½ pouces. Bec plus long que la tête ; première rémige la plus longue ; queue courte. Dessus d'un cendré de nuances variées, généralement assez clair, avec lignes blanches à la tête et au cou, et taches et bordure des plumes d'un blanc sale dans d'autres parties ; bas du dos brun foncé, croupion blanc avec bandes d'un brun foncé ; dessous blanc avec stries longitudinales au cou et taches sagittées ou en croissant à la poitrine, brunes ; secondaires et tertiaires barrées de blanc à l'extrémité. Queue blanche avec bandes brunes. Bec brun foncé, plus clair à la base ; pattes jaunes.