

Hydatide du sanglier, *Hydatis apris*.

Goeze, Eingew. tab. 17. fig. 1, 2.

Se trouve sur le foie du sanglier.

Hydatide du cochon, *Hydatis finna*.

Conique, enfermée dans un double sac ; l'intérieur adhérent par sa base.

Werner, Verm. Intest. 3, tab. 5.

Se trouve dans le lard, et sur les viscères des cochons, chez qui elle cause la maladie appelée ladrerie.

Hydatide du dauphin, *Hydatis delphinii*.

Conique, enfermée dans un double sac ; la tête grise ; cylindrique et sans crochets.

Voyez pl. 9 fig. 10, 11, où elle est représentée de grandeur naturelle dans son sac et hors de son sac, et fig. 12. La tête très-grossie.

Se trouve dans le lard, et sur les viscères du dauphin.

*Delphinus delphis*. — Linn.

Sac ovale, blanc, de 4 millimètres de long sur 5 de diamètre ; de substance coriace, dans lequel est renfermé une hydatide, qui en sort à volonté par une fente ovale, placée à une de ses extrémités.

Hydatide d'un millimètre plus courte que le sac. Cylindrique, couleur d'ardoise, terminée par une tête un peu plus grosse ; avec un enfoncement autour duquel sont quatre tubercules susceptibles de s'allonger et de s'élargir un peu. Il n'y a pas de crochets.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec celle du cochon et par sa forme et par sa manière d'être. Elle a été trouvée très-abondamment par Bosc, dans le lard d'un dauphin, et principalement dans celui qui avoisine les parties génitales. Il y en avoit aussi sur les viscères.