ivateurs es mau-

examen

ES

emence

achats

bes

goutter e, enfin uméra-

## DIVERSES MANIÈRES DE DÉTRUIRE LES MAUVAISES HERBES

Les moyens généraux de destruction des manyaises herbes sont :

- 1° Un système de rotation convenable et le déchaumage. La jachère;
  - 2° Un labour parfait;
  - 3° Un amendement suffisant du sol;
  - 4° Un égouttement ou assainissement complet ;
  - 5° Une surveillance active;
- 6° L'enlèvement de mauvaises clôtures, des tas de roches, des broussailles;
  - 7° Le recours aux autorités municipales, etc.
- 1° **Système de rotation.** Tout système de rotation destiné à détruire les mauvaises herbes devrait généralement avoir pour base les cultures sarclées et les fourrages verts. Dans les terrains tout à fait infestés, il est quelquefois bon d'attendre que les graines aient germé ou que les mauvaises plantes se montrent pour procéder aux diverses façons de culture, labour, hersages répétés surtont par un temps sec.

La seconde année: grain et semence de 12 à 15 livres au moins de trèfle à l'arpent. Quoique la semence de trèfle soit souvent infestée de graines de mauvaises herbes, une quantité suffisante de bonnes graines de trèfle étouffe toute mauvaise semence qui pourrait s'y trouver. De là la recommandation de semer 12 à 15 libres de trèfle à l'arpent.

Troisième année: pâturage de trèfle; cependant, il faut attendre que le sol soit bien rafferini avant d'y mettre les animaux et ne les y laisser que par intervalle. Labour d'automne plutôt mince.

Quatrième année: sur labour d'automne, grain, semence de trèfle et mil.

Cinquième anuée: prairie. Foin coupé assez vert. Seconde