

4° L'effet se produit dans un espace de temps variant de 20 minutes à 1 heure.

5° Son emploi, à la dose susdite, est exempt de dangers et d'inconvénients sérieux.

6° Les inconvénients ont été les suivants: vertiges pouvant persister 24 heures; transpirations et énervement passagers.

7° Certains sujets sont réfractaires à son action aux doses susdites que nous n'avons pas portées plus loin.

8° La répétition du médicament pendant plusieurs jours consécutifs ne nécessite pas toujours une augmentation de la dose pour produire le même effet.

9° Chez certains sujets, une 2<sup>me</sup> ou 3<sup>me</sup> dose ne produit plus aucun effet.

10° Dans aucun cas nous n'avons constaté d'éruptions cutanées dues à l'effet du remède.

11° L'antipyrine à 15 grains réussit à calmer les douleurs dans certains cas où des doses de  $\frac{1}{4}$  et  $\frac{1}{2}$  gr. de morphine échouent.

12° Dans certains cas non-seulement elle fait disparaître les douleurs mais elle paraît influencer favorablement la marche de la maladie.

13° Non seulement elle fait disparaître la douleur momentanément, mais souvent son effet calmant se prolonge plus ou moins de 1 à 3 jours et même plus.

14° Son emploi ne rencontre pas auprès des patients les mêmes objections que la morphine.

15° Elle ne crée pas, comme cette dernière, une prédisposition à l'habitude.

M. le docteur H. E. DESROSIERS nous communique les observations suivantes au sujet de l'antipyrine employée comme médicament analgésique.

*Obs. I.*—J. A. M.—âgé de 36 ans, syphilitique à la troisième période, se présente à la consultation le 20 mai, souffrant de violentes douleurs de tête. Ces douleurs sont à caractère lancinant, gravatives, et siègent au côté droit de la tête presque exclusivement, s'irradiant quelque peu dans le côté droit du cou et se faisant sentir principalement la nuit. Le malade a suivi un cours d'iodure de potassium deux ou trois mois antérieurement, à la suite duquel des plaques de rupia ont été guéries. On reprend l'iodure de potassium aux mêmes doses qu'auparavant, mais sans succès. Le mercure sous forme de calomel d'abord, puis en frictions, est, plus tard, substitué à l'iodure mais sans aucun résultat appréciable. La morphine est mal supportée. L'antipyrine est alors prescrite à dose de 15 grains, à répéter au bout de deux heures si la première dose est restée sans effet. Un soulagement évident suit la première dose du médicament, les douleurs de tête disparaissant tout à fait après la deuxième dose. Le soulagement ne dure que de 20 à 24 heures, et il faut répéter les doses le lendemain.