

faut suspendre le *salicylate de soude* et recourir aux bains froids : un toutes les 3 heures durant 10 minutes ou environ lorsque la température dépasse 39° C. Au bout de 4 jours, le mal est jugulé, les jointures redeviennent gonflées.

Le *chloral* est donné contre l'insomnie.

2° *Pulmonaires* : C'est la dyspnée rapidement suivie de point de côté ou de crachement de sang *œdème aigu* dont le traitement consiste dans des ventouses sèches (un verre à bords épais dans lequel on verse quelques gouttes d'alcool qu'on fait brûler pour faire le vide et qu'on applique immédiatement) appliquées en grand nombre sur toute l'étendue du thorax, en avant comme en arrière ; les injections d'éther (1 à 5 ou 6) faites profondément sous la peau ; les boueilles d'eau chaude aux pieds ; l'aération de la pièce.

C'est la *congestion pulmonaire* avec toux quinteuse suivie d'expectoration de spume gommeuse qui sera traitée par les ventouses sèches et les doses de salicylate à 8 ou 10 grammes (150 grains) par jour, sans craindre l'ivresse dans ces cas.

C'est la *pleurésie* qu'il faut surveiller et ponctionner *en cas* d'hydrothorax double ou abondant. Le salicylate sera continué.

3° *Cardiaques* : Il faudra surveiller le cœur durant tout le cours de la maladie. Le voilement des bruits du cœur et quelquefois l'apparition d'un souffle doux à la pointe devra engager le malade au repos absolu.

Le salicylate sera continué. Si le pouls s'accélère l'auteur donne la *spartéine* sous la forme suivante :

Sulfate du spartéine.....	o g r. 30 centigrammes.
Sirop de Tolu.....	30 grammes.
Eau distillée ou de tilleul.....	60 “

Deux cuillerées à soupe dans la journée.

Contre la douleur précordiale : ventouses scarifiées, pointes du feu, vésicatoires.

Si le pouls devient irrégulier, l'auteur donne la digitale comme suit :

Poudre de feuilles de digitale.....	o g r. 50 centigr.
Eau pour infusion.....	100 grammes.
Sirop de convallaria (ou simple).....	30 “

Mettre à infuser durant une demi-heure et prendre dans la journée. (1)

Dans le cas de myocardite avérée, donner la *cafféine*. Ce qu'il faut rejeter suivant l'auteur, ce sont : le tartre stibié, les mercuriaux, la saignée, l'alcool.

J. A. LESAGE.

(1) Nous préférons la *digitaline* en solution alcoolique titrée à 1 milligramme pour 50 gouttes, qu'on peut donner en une seule fois ou durant 5 jours à 10 gts par jour dans eau.