

Il insiste enfin sur ce fait que la ponction lombaire répétée ne dispense pas de prendre les soins d'antisepsie de la bouche, du nez et des oreilles, les plus minutieux, ni de trépaner les hématomes quand il y en a.

Ensuite, il relate les vingt observations qui viennent appuyer sa thèse. Il y a eu 17 guérisons sur les 20 cas. Des trois cas de mort, 1 n'avait pas été ponctionné, 1 ne l'avait été qu'une fois, et dans le troisième la mort est survenue à la suite de lésions pulmonaires, plusieurs mois après l'accident: dans ce dernier cas, il s'agissait de contusion cérébrale avec épanchement de sang.

Il a fallu, dans tous les autres cas, faire de trois à neuf ponctions pour obtenir la guérison qui est survenue entre quinze jours et deux mois après l'accident.

Ce travail apporte donc une contribution très importante à l'étude des fractures de la base du crâne. Il apporte des explications simples et rationnelles d'accidents inexpiqués jusqu'ici, et il fait entrevoir la possibilité de les guérir.

PÉDIATRIE

Traitement de la coqueluche par le fluoroforme, dans *Journal de Méd. et Chirurgie pratique*. Avril 1909.

Madame M. de Biehler (de Varsovie) apporte dans les *Archives de médecine des enfants* un nouveau témoignage en faveur du fluoroforme dans la coqueluche, médicament qui, comme on sait, a été très discuté.

Les observations de Madame de Biehler, au nombre de 89, sont bien en faveur de la méthode. Dans tous les cas, on a noté, en effet, dès le quatrième jour, parfois le troisième, souvent aussi vers le cinquième ou huitième jour, que le nombre des quintes, aussi bien que leur intensité, diminuaient d'un tiers ou de moitié. La guérison avait lieu au bout de vingt jours, dans 10 cas même au bout de quinze jours, et dans un cas au bout de douze jours. Les enfants plus jeunes guérissaient plus lentement.

Point de complications dans 87 cas. Dans 2 cas, une pneumonie intervint, l'état des enfants étant très grave, (un âgé de deux ans, l'autre d'un an et demi); on a prescrit encore des inhalations d'oxygène et de l'émulsion camphrée à côté du fluoroforme. Ces enfants avaient eu la coqueluche pendant cinq semaines après la guérison de la pneumonie.

Les vomissements disparaissaient sous l'influence du traitement aussi bien que les hémorragies.