

Sueurs des phthisiques (Seeford, Peering).

R	Agaricine,	gr j
	Spts Vini Rect.	ʒ j
	Glycerin.	ʒ iv

M.—Uue seringue entière à la fois.

Manie Mélancholie (Kéraval).

R	Paraldéide	} aa ʒ j
	Eau de Laurier cerise	
	Eau distillée	ʒ iij ss

M.—Plongez la solution dans l'eau tiède avant de l'injecter. Hypnotique et sédatif puissant.

Ver solitaire (Dr B. Persh.)

R	Ol. Crotonis Tigl.	gtt. j
	Chloroformi	ʒ j
	Glycerin.	ʒ j

M.—A prendre le matin à jeun. Administrez, la veille au soir, un laxatif salin.

Fièvre intermittente

R	Thallin Sulp.	gr x v
	Aquæ dest.	ʒ iij ss

M.—Employez toujours la solution tiède. Deux grains de cette substance injectés par la voie hypodermique, suffirait pour déterminer un abaissement de la température de deux degrés et 2 ou 3 dixièmes, pendant une durée de 6 à 9 heures. (*Bourneville et Bricou.*)

Variole (par J. Octvos.)

L'auteur donne la formule suivante :

R	Xylène pur	ʒ j et grs v
	Eau de menthe	ʒ j ss
	Eau distillée	ʒ j ss
	Sirop de Cannelle	ʒ ij ss
	Mucilage de gomme	ʒ ij ss

M.—Une cuillerée à bouche toutes les deux heures.

Les pustules sèchent sans complication et presque toujours sans laisser de marques.

Ce médicament ne produit aucun trouble digestif, il n'a aucune action sur la température. Employé dans 315 cas.

(*F. W. in Journal des Praticiens.*)