renfermé triangulaire avec un petit sillon médian. Ailes subhynlines avec l'extrémité, à partir du stigma, brun-violacé, le stigma jaune. Pattes fauves, les hanches, les trochantins, les cuisses postérieures avec la base des antérieures, noir, le dedans des cuisses de devant, avec les 4 jambes antérieures en dehors, jaune. Abdomen poli, brillant, noir avec une efflorescence plus ou moins grisatre, tous les segments avec une bande jaune au sommet, cette bande dilatée sur les côtés, le premier segment avec cette bande du sommet plus large que les autres et se continuant sur les côtés jusqu'à la base où elle se replie en dedans pour former une tache circulaire ou allongée de chaque côté, en laissant le milieu libre, le dernier segment fauve.

3-Avec les segments abdominaux 6 et 7 jaunes.-C.

Voisin des venustus et modestus, Cress. mais se distinguant surtout du premier par ses mandibules jaunes et du dernier par les taches de son premier segment abdominal.

Fam. XVIII. CRABRONIDES. Crabronida.

Tête forte et souvent très grosse. Mandibules le plus souvent sans échancrure au côté interne.

Yeux souvent très grands, et antérieurs plutôt que latéraux, couvrant la face en grande partie et ne laissant qu'un front fort petit.

Antennes insérées dans un sillon de la face au dessous du milieu, séparées l'une de l'autre par une crête ou carène, à premier article allongé, le reste plus ou moins en massue. Palpes maxillaires de 6 articles, les labiaux de 4.

Thorax court, assez robuste; le métathorax portant sur son disque un espace souvent renfermé par une carène ou une petite côte, auquel on donne le nom de propode (propodeum), et qui par sa forme et les stries qu'il porte fournit un excellent caractère spécifique.

Ailes souvent enfumées, assez petites, très variables dans la disposition des nervures suivant les différents genres, portant une cellule radiale souvent appendiculée, 2 ou 3 cellules cubitales fermées, la 2e, le plus souvent, recevant les 2 nervures récurrentes.

Pattes plutôt courtes que longues, généralement avec les jambes et les tarses ciliés-épineux.