

son écusson et ses tarses blancs. Pourrait peut être former un genre distinct ?

53. Ichneumen nitidus. (Ichneumon propre). *nov. sp.*

♂—Long. .45 ponce. Noir, brillant, finement ponctué. La face au dessous des antennes, le chaperon, les mandibules, les palpes, le scape en dessous, le collier en avant, les écailles alaires, une forte ligne sur les bords latéraux du mésothorax, une ligne courbée en équerre au dessous des ailes antérieures, l'écusson et le post-écusson, le dessus du métathorax avec une petite tache détachée de chaque côté, d'un blanc d'ivoire. Antennes noires, fortement dentées en dessous. Ailes, nervures brunes, stigma noir. Pattes blanches, les trochantins et les cuisses des 2 paires antérieures, les cuisses postérieurs avec leurs trochantins et les extrémités de leurs jambes et de leurs tarses, noir. Abdomen convexe, opaque, finement ponctué; le 1er segment noir, avec 2 petites taches blanches sur le pédicule, finement aculé à l'extrémité; segments 2, 3, et 4 d'un jaune orange, le 4^e marginé de noir à l'extrémité, le reste de l'abdomen noir; dessous même coloration qu'en dessus.

Un seul spécimen ♂.

54. Ichneumon erythopygus. (Ichneumon derrière-rouge). *nov. sp.*

♀—Long. .30 ponce. Rouge et noir. Tête noire; les orbites antérieurs au dessous des antennes, un point de chaque côté du chaperon, blanc; palpes bruns. Antennes assez longues, dressées, avec un anneau blanc au delà du milieu. Thorax noir, un point en avant de l'insertion des ailes, avec une petite ligne en dessous, blanc. Mésothorax fortement impressionné jusque sur le disque. Écusson noir. Métathorax entièrement roux, rugueux, à carènes distinctes, subépineuses aux angles latéraux, aréole centrale transversale, réticulée. Pattes rousses; les hanches antérieures noires, les autres rousses, tarses postérieurs avec l'extrémité de leurs jambes brunâtres. Ailes légèrement enfumées, nervures brunes, plus claires à la base; stigma noir; aréole subtriangulaire. Abdomen en ovale, large au milieu, entièrement roux, à l'exception des deux derniers segments qui sont noirs et luisants; le 1er segment fortement élargi à l'extrémité, bicaréné, rugueux.

Deux spécimens ♀. Espèce bien distincte par son thorax noir avec le métathorax roux.

8.—Écusson jaune ou roux; abdomen rouge ou noir; thorax plus ou moins roux.

55. Ichneumon fortis. (Ichneumon fort). *nov. sp.*

♀—Long. .70 ponce. D'un noir ferrugineux; la face plus ou