

pluses de la végétation. Règle générale, les dernières coupes contiennent, poids pour poids, plus de matière sèche, et fournissent invariablement un fourrage plus riche en albuminoïdes que les premières coupes. Par exemple dans la parcelle fauchée quatre fois, une tonne de la quatrième coupe (18 septembre) équivaut, au point de vue des albuminoïdes que les premières coupes. Par exemple dans la parcelle fauchée quatre fois. De même, dans le cas de la parcelle fauchée deux fois nous trouvons que la deuxième coupe possède la valeur nutritive la plus élevée par tonne. (Voir tableau III.)

En terminant, mettons en regard la quantité d'albuminoïdes, *par acre*, dans les deux coupes et les quatre coupes de luzerne, respectivement.

ALBUMINOÏDES—Livres par acre.

	Parcelle fauchée deux fois.	Parcelle fauchée quatre fois.
	Liv.	Liv.
1 juin.	...	74
21 juin.	156	...
15 juillet.	...	74
1er août.	66	...
19 août.	...	83
18 septembre.	...	50
	222	281

Un fait se dégage clairement de ces chiffres: c'est que, si la quantité de matière sèche est un peu grande pour la parcelle qui a été fauchée deux fois, d'autre part la parcelle qui a été fauchée quatre fois a fourni, de beaucoup, la quantité la plus forte d'albuminoïdes.