Traitement de la dysentérie.—Henry Colley Marchidit que dans les dysentéries ordinaires des adultes avec èprentes, ténesme, garde-robes fréquentes et s'accompagnant de mucus sanguinolent sans matières fécales proprement dites meilleur traitement consiste à donner une solution de bichlorure de mercure. En quelques heures, le ténesme cesse, et about de deux ou trois jours les selles prennent un bon aspect.

—Medical Times and Gaz.—Revue de Thérapeutique.

Traitement de quelques tumeurs adipeuses.—Le Dr Schwalbe, au dernier Congrès de chirurgiens allemands, publié une méthode de traitement de tumeurs télangiectaiques, de lipômes et même de petites hernies par l'injection d'une solution alcoolique à 15 ou 20 p. 100. Par ces injection, qu'il répète suivant les cas, deux fois par semaine, et pendant plus ou moins longtemps, Schwalbe a obtenu d'excellent résultats. Une tumeur télangicetasique de la face qui avait résisté au thermo-cautère, fut traitée par les injections alcodiques, et la tumeur s'affaissa progressivement pour disparaitéen totalite.—New-York Medical Record.—Revue de Thérapeutique médico-chirurgicale.

Traitement de la dyspepsie gazeuse.—Dans cette forme de dyspepsie accompagnee de termentation et d'abbedant dégagement de gaz après le repas, le meilleur remède le chloroforme à la dose de 13 à 20 gouttes dans du sirop supple. Après quelques instants les gaz sont expulsés de l'emmac et la fermentation est arrêtée.—Med. and Sury. Reporte. Revue de Ther. Med. Chir.

Prurit vulvaire.-

Poudre de gomme arabique	3ij
Baune de Pérou	3i
Huiles d'amandes douces	ziij
Eau de roses.	ξi

qu'on appliquera avec un pinceau sur les endroits où il y la démangeaison.—Revue de Thérapeutique médico-chirurgit