

Pour bien réussir avec la position de Sims il faut que la vulve soit sur le même niveau que la partie externe du genou supérieur. (Prof. BRENNAN.)

---

Aucun des nouveaux toniques : adonidine, spartéine, strophanthus, convallaria, n'égale la digitale comme tonique cardiaque et vasomoteur. (Prof. DESROSIERS.)

---

Avant de tenter l'extraction de corps étrangers de l'oreille, il faut d'abord s'assurer s'il en existe réellement et quelle en est la nature. (Prof. FOUCHER.)

---

Il faut des lésions graves pour que l'on se permette d'enlever un ovaire.—On ne voit l'inutilité de l'opération quelquefois que lorsque l'ovaire est "sauté." (Prof. BRENNAN.)

---

Pour obtenir des effets stimulants sensibles de l'emploi de la caféine, il est souvent nécessaire de la prescrire, à l'exemple de Huchard, à doses élevées : 36 à 54 grains par jour. (Prof. DESROSIERS.)

---

L'examen attentif des deux formes d'injection conjonctivale et pislérale permettra toujours de différencier deux ordres de lésions oculaires parfaitement distinctes comme gravité et traitement. (Prof. FOUCHER.)

---

Dans un cas de vaginisme, enlevez les caroncules myrtiformes, faites la dilatation brusque du sphincter vulvaire et du sphincter anal. N'oubliez pas la possibilité de *fissures uréthrales* comme cause; dilatez au besoin, le méat. (Prof. BRENNAN.)

---

Les stimulants alcooliques donnés au cours d'une maladie adynamique comme la fièvre typhoïde, doivent être administrés à doses fractionnées et soutenues : 1 gr. toutes les  $\frac{1}{2}$  h. ou toutes les heures, au besoin. (Prof. DESROSIERS.)

---

N'enlevez jamais des ovaires congestionnés ou enflammés à répétition avant d'avoir tenté au préalable tout autre traitement et surtout jamais avant d'avoir pratiqué la dilatation du col utérin, avec courage s'il y a la moindre indication. (Prof. BRENNAN.)

---

Les préparations aqueuses (décoction et infusion) de digitale