

Côte au sud
du cap
Wolstenholme

dies s'élèvent de plus en plus haut vers l'intérieur. Lors de notre retour du côté ouest de la baie d'Hudson dans le mois de septembre, j'explorai cette partie de la côte dans une petite embarcation, et je trouvai que les roches consistaient en gneiss ordinaires, avec veines et plaques de granit rouge à grains fins en quelques endroits. Sur la terre ferme, à une vingtaine de milles au sud du port Laperrière, il y a un très ancien campement d'Esquimaux, qui est encore habité. Nous n'avons pu savoir des naturels quel était le nom qu'ils donnaient à cet endroit, et comme il était plus commode d'avoir un nom pour le désigner, nous l'appelâmes Hyla.

Retraite de la
mer.

Dans ce voisinage, les preuves de la rapide retraite de la mer sont visibles de tous côtés, sous forme de baies et de lagunes dont l'eau se retire, ainsi que dans les plages soulevées et les crêtes de galets. Ces dernières forment parfois des isthmes qui séparent des baies ou relient des îles entre elles ou avec la terre ferme. Des étangs et de petits lacs, d'un mille ou deux de longueur, sont nombreux entre les chaînes de collines ou de petites montagnes en arrière. L'argile et le sable dans les vallées entre ces éminences, jusqu'à une élévation d'environ 200 pieds au-dessus de la mer, sont remplis de coquilles marines, dont les genres *Tellina Saxicava*, *Cardium*, *Pecten*, *Mya*, *Mytilus* et *Astarte* sont les plus communs. Vues à

Apparence du
pays.

distance, ces côtes et montagnes ont une apparence nue, mais en avançant dans la contrée, les graminées et les sauges, ainsi qu'une variété de plantes arctiques qui croissent autour des étangs et des lacs, donnent au paysage une apparence de verdure très agréable en beaucoup d'endroits. On ne voit aucune espèce d'arbrisseaux, à l'exception du saule rampant, mais les Esquimaux se font des nattes pour le plancher de leurs tentes d'été en attachant ensemble, dans un ordre très régulier, de petites branches de bouleau nain (*Betula glandulosa*, Michx.) d'environ trois pieds de longueur, qu'ils trouvent dans l'intérieur, à ce que nous comprimes. Les naturels de cette partie de la côte vivent de la chasse de l'élan dans les collines, et de la baleine blanche, de l'ours polaire, du morse et du phoque sur la côte. A certaines saisons, ils se procurent un bon approvisionnement de gibier aquatique et de truite de ruisseau.

Grosse veine
de quartz et
feldspath.

Tout près de la côte, en arrière d'une île, et à environ un mille au sud de l'ancien campement esquimau ci-dessus mentionné, il affleure une veine très saillante dans la façade d'une falaise de gneiss. Elle a environ trente pieds de largeur à un endroit et consiste en quartz blanc près des épontes, avec feldspath rouge grossièrement cristallin au centre. J'ai aussi observé quelques plaques de mica inégal, de couleur foncée.

Le contour général du terrain sur cette partie de la côte, tel qu'on le voit d'une certaine distance en mer, s'incline graduellement vers l'ouest, jusqu'à ce qu'il atteigne le bord des grands précipices du cap Wolstenholme. Le plateau élevé au-dessus des précipices a une apparence passablement égale, comme s'il eût été nivelé et aplani par la glace. Les pré-