

et l'énlèvement des fausses membranes est certainement le moyen le plus préventif de l'empoisonnement et nous devons nous en servir avec activité.

Hull, novembre 1881.

DR JOSEPH BEAUDIN.

REVUE DES JOURNAUX.

PATHOLOGIE ET CLINIQUE MÉDICALES.

Diagnostic des maladies du foie en général.—Autant les moyens physiques d'exploration nous rendent de services dans le diagnostic des affections du poumon et du cœur, autant ils sont infidèles quand il s'agit de rechercher celles du foie. L'auscultation, ce merveilleux instrument d'investigation dans les maladies cardiaques ou pulmonaires nous fait ici complètement défaut; la percussion et la palpation, utiles sans doute, sont, comme nous le montrerons, trop souvent rendues impuissantes ou trompeuses pour telles ou telles raisons de conformation anatomique. Il en résulte que le médecin n'est souvent mis que par hasard sur la piste d'une maladie du foie et c'est naturellement dans celles qui déterminent de l'ictère que son attention est plus tôt attirée de ce côté. Mais il en est de l'ictère comme de l'albuminurie dans les maladies du rein, c'est un symptôme qui peut manquer ou être très fugace, qui peut être déterminé aussi par la souffrance d'autres organes, et qui, par conséquent, ne saurait avoir de valeur pathognomonique.

Sans doute quand nous nous trouvons en présence d'un malade qui a de l'ictère, une douleur dans l'hypochondre droit, et qu'une déformation apparente siège dans cette région, notre première idée est en faveur d'une affection du foie, mais combien ces cas typiques sont rares, et combien il importe d'avoir présente à l'esprit toute la gamme des troubles fonctionnels si variés qui ressortissent à une lésion hépatique?

Il est incontestable que toute maladie du foie donne lieu, de prime abord, à des troubles *gastro-intestinaux*; mais peut-on distinguer les troubles digestifs dépendant d'une affection hépatique, de ceux qui résultent, par exemple, d'une lésion de l'estomac ou d'une maladie générale comme la tuberculose ou la chlorose? L'affirmer serait faire preuve d'outrecuidance clinique.