

**Traumatisme grave chez une femme en état de grossesse
gémellaire. Expulsion de l'un des œufs à 80 jours,
l'autre œuf se développant jusqu'à terme ;**

par E. SIROIS, M.D., Three Rivers, Mass, E.-U.

Le premier décembre dernier je fus appelé près de Mme H qui, me dit-on, venait de faire une chute. Ma patiente (pesant environ 190 lbs) était tombée, tête première, au bas d'un mur de 10 à 12 pieds de hauteur. Quand je la vis, une demi heure après l'accident, elle rendait du sang par le nez et par les oreilles, et délirait. Malgré tout ce que je pus faire pour elle, son état s'aggrava au point que, cinq heures plus tard, elle était dans un coma profond : insensibilité complète, pupille extrêmement dilatée, paralysie de la vessie et du rectum, respiration laborieuse, de six à douze par minute, pouls filiforme, très-irrégulier, oscillant entre 120 et 160. Je consultai un confrère qui crut à une lésion grave de la base du crâne et déclara la femme perdue. Pour moi, je ne compris qu'une chose, c'est qu'elle devait expirer avant le jour. Je n'en restai pas moins près d'elle, ayant l'air de faire quelque chose, pour ne pas enlever trop soudainement le peu d'espoir qui restait à la famille éplorée.

Vers la fin de la nuit, onze heures après l'accident, la respiration devint, par degrés, plus régulière, moins laborieuse; le pouls devint plus fort et resta à 130. À neuf heures du matin, (2 décembre), quatorze heures après l'accident, elle avait complètement repris connaissance, mais se plaignait de souffrances intolérables à la tête, au cou et dans les épaules. Je savais que la malade était enceinte, mais les douleurs actuelles étaient de nature à distraire mon attention du côté de l'utérus. Le dixième jour, elle perdit par le vagin environ deux onces de sang qui furent suivies de l'expulsion d'un œuf, sans douleurs parturientes. Alors tout malaise disparut: plus de maux de tête, ni de douleurs dans les membres. Deux jours après, ma patiente était à ses occupations ordinaires.

L'œuf rejeté était entier. Je l'ouvris moi même et constatai la présence d'un embryon très bien formé et pouvant avoir 70 à 80 jours. Le 16 mai, c'est-à-dire moins de sept mois après l'accident, Mme H. mettait au monde un garçon, à terme, du poids de 10½ lbs. Elle avait donc, lors de l'accident, perdu la moitié d'une conception double.

Three Rivers, Mass, 30 mai 1887.