

lines concentrées. La guérison s'obtient aussi bien, quand on a soin que la solution soit absolument isotonique, qu'elle ait la même tension osmotique que le sang, qu'elle congèle à 0,56 comme c'est le cas pour les solutions de salicylate de soude à 3 pour 100.

Un homme affecté de rhumatisme partiel du genou avec tendance à la chronicité était retenu au lit depuis deux mois et n'avait, en six semaines, bénéficié en aucune façon de mes tentatives de traitement soit local soit général: 20 centigrammes de salicylate injectés en une seule séance lui ont permis de se lever le jour même; le lendemain il était guéri.

Puis est venue toute une série de cas de polyarthrites aiguës, les unes fébriles, les autres apyrétiques, où j'ai vu 5, 10, 20 centigrammes du médicament faire disparaître rougeur, douleur, épanchement, impotence; et l'effet favorable se produisant seulement dans la jointure traitée. Les autres articulations ne sont nullement modifiées; elles ignorent ce qui s'est fait à côté d'elles et ce qui en est résulté. Il se peut même que de nouvelles arthrites se produisent; elles n'influencent pas celle qui guérit, de même qu'elles ne sont pas influencées par elle. On guérit, au choix, une des articulations; les autres restent malades ou peuvent devenir malades.

C'est la preuve que les doses minimales injectées localement n'ont pas une action générale et que ce n'est pas par une action générale sur le sang ou sur le système nerveux que se produit la guérison locale. Cela prouve aussi que, quand le traitement général se montre efficace, chaque articulation prise en particulier guérit non par la masse totale du médicament qui est répandue dans toute l'économie, mais par la très petite portion qui est livrée à cette jointure.

Les guérisons par injections locales de doses minimales, souvent définitives sont parfois précaires. Rien n'empêche que le traitement local soit continué ou repris, de même que rien n'empêche de traiter simultanément ou successivement plusieurs arthrites.

. En tout cas, si, dans le rhumatisme articulaire aigu ou erratique, le traitement local est efficace, il ne doit pas être considéré comme suffisant; sans doute il fait tomber la fièvre quand il s'agit d'arthrite unique, mais il n'empêche pas le développement de nouvelles arthrites ni l'invasion des grandes séreuses.