

nom de première période ou premier degré, est un diagnostic tardif;

30. Le premier symptôme physique de la tuberculose pulmonaire ou ganglio-pulmonaire est une inspiration anormale;

40. Cette inspiration anormale, quand elle est fixe et persistante au même point, est, à elle seule, le signe certain de la tuberculose;

50. La curabilité de la tuberculose étant proportionnelle à la précocité du diagnostic, on conçoit l'importance qu'il y a de reconnaître cette maladie aussitôt que possible;

60. Ce diagnostic précoce, si important pour le malade, est au moins aussi important pour la société tout entière, car au cours de la première et de la seconde étape, le malade tousse très peu ou ne tousse pas; il est donc inoffensif pour son entourage. Traitée et guérie à cette époque, la tuberculose cesse d'être contagieuse;

70. La tuberculose comporte deux étapes et trois périodes. C'est au cours des deux étapes qu'il faut la reconnaître, et non pas au cours de ses périodes;

80. Pour faire le diagnostic, le médecin, au début de la maladie, ne doit pas se contenter d'examiner dans une famille le malade pour lequel on l'appelle. Il doit aussi, et systématiquement, ausculter les membres de la famille pour peu qu'ils soient suspects et faire ainsi le dépistage de la maladie, alors qu'elle est méconnue de tous. Très souvent, il trouvera autour du malade la première ou la seconde étape en évolution, et son devoir strict sera d'imposer le traitement à ces malades ignorants de leur propre mal.

Ainsi faisant, il rendra les plus grands services, et à la famille dont il a charge, et au corps social.

M. d'Espine, de Genève, rend hommage à son ami le professeur Grancher, qui a donné le moyen de dépister les premiers signes de la tuberculose pulmonaire; mais pour sa part, et d'après son expérience, il insiste sur le diagnostic précoce de l'adénopathie bronchique. Il y a une série d'enfants pour lesquels nous ne trouvons rien à l'auscultation rigoureuse, et chez lesquels l'adénopathie bronchique se reconnaît par le retentissement vocal en un point de la région interscapulaire, au voisinage de l'épine de l'omoplate.