

nelsen af jordbruket innan farmaren hade lärt sig hemligheten att så tidligt—så snart två a tre tumns djup af jorden frostfri—och innan de hade begagnat aklimatiserad utsäde rätta slaget hufvudsakligen („Red Fyfe“) som de nu göra. I är icke mera anledning att frukta sädesförstörande froster i Manitoba och Assiniboia härefter, under behörig odling, än i Ontario eller Iowa. —Det är ingen brist på regn under växttiden året i Manitoba, Assiniboia och Saskatchewan. Äfven i trakter väster om södra Saskatchewan, hvilka voro ansedda för långt från de bästa för hvete odling, har jordbruk försökts med framgång, som synes af resultaten vid de tio experimenterade farmar, hvilka äro spridda emellan Moose Jaw och Calgary. Blottadt jordbruk kommer sannolikt att idkas i stor skala i det distrikt, såsom varande mest lempligt i afseende å jordmånen och klimatet. —

JORDMÅNEN.

Jordmånen består till det mesta af en lös svartmylla, hvilande på ett underlag af svartblå lera eller sand och lerblandad jord. Dess produktions förmåga är utomordentligt kraftig och framsträcker de rikaste skördar, isynnerhet af hvete, men äfven alla öfriga sädesslag och rotfrukter kunna med stor framgång odlas och senare upprättas vanligen en utomordentligt storlek. Hvete kan odlas på samma åker i 10 till 15 år årad utan att någon gödning behöfver användas.

LANDTMÄTERISYSTEMET.

Landtmäteri Systemet i Manitoba och Nordvestra Territoriet är ganska enkelt. Allt land är uppmätt i kvadrater (Townships) underhålls. Hvarje township är åter indelat i 36 Sektioner (Sections), af hvilka hvar och en är 1 eng. kvadratan i omkrets och innehåller 36 aker. Dessa äro ytterligare fördelade i 4 sektioner om 160 aker vardera. De särskilda sektionerna i hvarje township äro numrerade på sätt som omstående figur utvisar.

Car
nil på
idda n
11 &
underhå
Jer
priser
kel ko
ned en
All
D. S. V.
kompan
onligt